BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM + CARBOXIN + TIRAM

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium japonicum.
Carboxin: 5,6 dihidro-2-metil-1,4 oxatiin-3-carboxanilida
Tiram: bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.) + oxatiin carboxamida + dimetilditiocarbamato.
Acción: de contacto, sistémica y promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: curasemillas, fungicida e inoculante.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*	Dosis fungicida: 250 cm3/100 kg de semilla. Dosis inoculante soja: 200 cm3/100 kg de semilla. Concentración por gramo de producto: 5 x 10exp.9 bact/cm3 a la fecha de fabricación y no menos de 5 x 10exp.8 bact/cm3 a la fecha de vencimiento.		Tratamiento de semillas previo a la siembra.

Información General:

Inoculante: elaborado con cepas seleccionadas especialmente de bacterias fijadoras de nitrógeno. Aplicando este inoculante de acuerdo a las instrucciones enunciadas, proporciona no menos de 80.000 bacterias viables específicas por semilla. A la elaboración contiene 5x10 exp9 bacterias viables/cm3 de inoculante. A vencimiento contiene 1x10 exp8 bacterias viables/cm3 de inoculante cuando el producto se almacena en condiciones refrigeradas.
Fungicida: es un producto que actúa interfiriendo en los procesos respiratorios del hongo, afectando tanto a los presentes en la semilla como a los existentes en el suelo. Es un estimulante de crecimiento que actúa en el metabolismo del nitrógeno. Incrementa la absorción de nitratos y favorece la inducción de la enzima nitrato-reductasa.

Método de aplicación:
Este Pack contiene la cantidad necesaria de fungicida e inoculante para tratar 4000 kg de semilla de soja. Agitar ambos productos antes de usar.
Preparación para 4000 kg de semilla: Mezclar el contenido de los dos bidones de fungicida (10 litros) junto con las 4 vejigas de inoculante (8 litros). Agitar la mezcla. Se recomienda realizar el tratamiento antes de transcurrida una hora desde su preparación. Aplicar uniformemente sobre las semillas en forma inmediata.
Preparación para 50 kg de semilla: Colocar 125 cm3 de Vitavax® Flo junto con 100 cm3 de inoculante. Agitar la mezcla. Se recomienda realizar el tratamiento antes de transcurrida una hora desde su preparación. Aplicar uniformemente sobre las semillas en forma inmediata.

Compatibilidad: en caso de usar insecticidas o fungicidas, deberán aplicarse primero y posteriormente el inoculante.

Importante: este producto está esterilizado previo a la incorporación de Rizobios suministrando exclusivamente bacterias fijadoras de nitrógeno a las semillas sin otros organismos contaminantes.
Es selectivo, no perjudica el desarrollo de hongos benéficos como las Trichodermas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales vigentes.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica + 7 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, protección respiratoria adecuada, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas y delantal durante la aplicación.

Información Toxicológica:

Del principio activo (carboxin + tiram):
DL 50 oral aguda en rata: 3.820 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 8.020 mg/kg
CL 50 inhalación en rata: 20 mg/l

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: 1.600 mg/kg
DL 50 dermal aguda en conejo: > 10.000 mg/kg

CL 50 en aves: codorniz 10.000 mg/kg
CL 50 en peces: pez sol 11.2 ppm. - trucha 6.6 ppm

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.

Vitapack: compuesto por los siguientes productos: Inoculante Vitabacter Soja y Vitavax Flo.
Vitapack Preinoculado: compuesto por los siguientes productos: Inoculante Vitabacter Soja, Vitavax Flo + Nodupro.