BROMACIL

Nomenclatura Química:
bromacil: 5-bromo-3-secbutil-6-metil-uracilo
Clasificación Química: uracilo.
Acción: residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	Abrepuño colorado (*Centaurea calcitrapa)* Altamisa (*Ambrosia tenuifolia)* Cebadilla criolla, Cebadilla australiana, Cebadilla (*Bromus spp.)* Cebollín (*Cyperus spp.)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (*Plantago lanceolata)* Nabo (*Brassica campestris)* Pasto de cuaresma (*Digitaria spp.)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	Para malezas anuales: 2 a 4 kg/ha Para malezas perennes: Suelo liviano: 4 a 5 kg/ha Suelo medio: 5 a 6 kg/ha Suelo pesado: 6 a 8 kg/ha		Para cítricos: plantaciones establecidas de 4 años o más. Aplicar preferentemente en primavera y otoño, antes que las malezas comiencen su ciclo, habiendo suficiente humedad en el suelo. Realizar 2 aplicaciones por año de 3 a 4 kg/ha c/u. El control de malezas perennes puede mejorarse realizando labores mecánicas previas al tratamiento. No trabajar el suelo después de aplicar bromacil a fin de no reducir la efectividad del tratamiento.

Nota: el bromacil puede ser aplicado en la taza (proyección de la copa del cítrico en el suelo), o en bandas o sobre la superficie total del cultivo. Todas las dosis que se indican en el cuadro son para tratamientos totales; por lo tanto para aplicaciones en bandas o limitadas a las "tazas" debe usarse una cantidad proporcional a la superficie efectivamente tratada.

Información General:

Bromacil es un herbicida efectivo y poderoso para el control general de malezas anuales cuando es usado a dosis bajas, y para el control de perennes y anuales cuando es usado en dosis altas.
Es un producto de acción residual, y penetra casi exclusivamente por vía radical. Los efectos demoran en aparecer y puede que no sean evidentes hasta que el producto haya sido llevado a la zona de las raíces por la humedad (lluvias o riego).
El grado de control y la duración del efecto podrán variar con la cantidad de producto aplicado, textura del suelo, lluvias y otras condiciones.

Equipos y técnicas de aplicación
Bromacil puede ser aplicado con las pulverizadoras de herbicidas de uso común, siempre que estén provistas de un sistema de agitación.
En cultivos, aplicar con barra asperjadora usando un mínimo de 400 l/ha de agua, con una presión de 30 a 40 lb/pulg2 (2 a 2,75 bar).
Se recomienda el uso de filtros de malla 50 en la bomba y en los picos, los cuales estarán provistos de pastillas de abanico. Requiere una continua agitación mecánica o hidráulica en el tanque para mantener el producto en suspensión. No utilizar sistemas de agitación por aire.
En áreas no cultivadas se puede efectuar también con lanzas, utilizando un mínimo de 2000 l/ha. En áreas pequeñas se pueden utilizar pulverizadoras manuales.
La aplicación se debe realizar un poco antes o durante el período de crecimiento activo de las malezas. Si éstas se presentan en gran densidad, se obtendrán mejores resultados si previamente son removidas por medios mecánicos. No aplicar sobre suelos helados.
Bromacil puede ser aplicado en las "tazas" (proyección de las copas de los citrus en el suelo), en bandas, o sobre la superficie total del cultivo. La humedad es necesaria para la activación del herbicida. Los mejores resultados se obtienen con lluvias o riegos posteriores hasta 2 semanas después de su aplicación.
Después de la aplicación puede ocurrir una clorosis del cultivo, de efecto sólo temporario.

Restricciones de uso
Evitar el contacto de la aplicación con hojas y frutos.

No utilizar en suelos que contengan menos del 1 % de materia orgánica, o de drenaje deficiente.
No aplicar más de 12 kg/ha por año.
No tratar árboles plantados en surcos, ni plantas enfermas con podredumbre del pie o "gomosis" (Phytophthora citrophthora y Phythophtora parasitica).
No aplicar en plantaciones de cítricos intercalados con otras plantas.
En áreas tratadas con bromacil, no plantar citrus hasta un año después, y otros cultivos hasta dos años después.

Derrames:
Producto sin preparar: barrer y recoger con pala el producto derramado y colocarlo en un recipiente rotulado.
Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelos afectados; colocar en un recipiente rotulado.
Llevar el recipiente rotulado a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HARC) ó 5(HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: protector facial, guantes y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.
Aplicación: protector facial, guantes de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del formulado al 80%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5,2 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	No irritante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.