BROMADIOLONE

Nomenclatura Química:
bromadiolone: (hidroxi-4'-cumarinil-3)-3-fenil-(bromo-4-bifenil-4')-1-propanol-1 ó 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicumarina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: cumarina.
Acción: ingestión.

Uso: rodenticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas agrícolas Saneamiento ambiental	Rata alejandrina (*Rattus rattus alexandrinus)* Rata de agua o de Noruega (*Rattus norvegicus)* Rata de los tejados (*Rattus rattus)* Rata gris (*Rattus rattus frugivorus)* Ratón común (*Mus domesticus)* Ratón de campo (*Apodemus sylvaticus)*	Ver M.A.		Se emplea en forma de cebo, distribuido en los lugares frecuentados por los roedores.

Información General:

Este producto, como todos los anticoagulantes, actúa inhibiendo la formación de protrombina originando así hemorragias mortales.
Recomendaciones generales: es importante mantener el suministro del cebo hasta que los roedores dejen de ingerirlo. Una vez finalizado el consumo del cebo y al no observarse signos de la presencia de roedores, deberán eliminarse los recipientes.

Derrames:
No aplica por tratarse de cebo en bloques o briquetas. Manipular siempre con elementos de protección personal. Utilizar guantes impermeables.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar antiparras y guantes impermeables. Utilizar ropa de protección personal / guardapolvo durante el manejo.

Información Toxicológica:

DL 50 dermal aguda del P.A. (conejos): > 400 mg/kg.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.