BROMOXINIL

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS BROMOTRIL - MEXTROL.

Nomenclatura Química:
bromoxinil: éster octanoico de ácido 3,5 - dibromo - 4 - hidroxibenzonitrilo.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: hidroxibenzonitrilo.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Abrepuño (*) (*Centaurea melitensis*) Apio salvaje (*Apium leptophyllum)* Apio cimarrón (*) (*Ammi majus*) Bejuco (*Ipomoea trichocarpa var. australis)* Bolsa de pastor (*) *(Capsella bursa pastoris)* Botón de oro (*Hymenoxis tweediei)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus thoermeri)* Chamico (*) *(Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Cicuta (*Conium maculatum)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Flor amarilla (*) *(Senecio burchelli)* Flor de pajarito (*Fumaria agraria)* Flor morada (*Echium lycopsis)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Mostacilla (*) *(Sisybrium officinale)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabo (*)	1,5 - 2,0 l/ha	30	La aplicación debe hacerse cuando el cultivo tiene 3 hojas verdaderas.
Alfalfa (*) Pasturas Consociadas (*) Césped(*)	1 a 1,5 l/ha ó Adama Essentials Bromotril + 2,4 DB 100% 0,5 a 1 + 0,2 a 0,4 l/ha (*)		Cuando las leguminosas tienen 30 hojas trifoliadas (no aplicar con temperatura y humedad elevadas). Gramíneas desde la emergencia. Las aplicaciones otoñales son las más recomendadas. (*)
Alfalfa	1,0 - 1,5 l/ha		Cuando las leguminosas tienen 3 hojas trifoliadas.
Caña de azúcar	1,0 - 1,5 l/ha Adama Essentials Bromotril + 2,4 D 100% 1 a 1,5 + 0,4 a 0,6 l/ha(*)		Desde que emerge la caña. En mezclas con 2,4 D desde los 30 a 60 cm de altura. (*)
Cebolla	1,0 - 1,5 l/ha	30	La aplicación debe hacerse cuando el cultivo tiene 2 hojas verdaderas.
Cereales de invierno			Puede mezclarse con 2,4 D 40% (0,5 - 1,0 l.) Desde 2 - 3 hojas hasta fin de macollaje.
Cereales (*) Maíz (*) Sorgo (*)	1 a 1,5 l/ha ó Adama Essentials Bromotril + 2,4 D 100% 0,5 a 1 + 0,2 a 0,3 l/ha(*)		Desde que el cultivo tiene 2 a 3 hojas hasta el fin de macollaje. Desde los 15 cm de altura hasta el fin de macollaje para cereales; hasta 30 cm de altura para sorgo y maíz(*)
Lino	1,0 - 1,5 l/ha		Se puede mezclar con MCPA 28% (0,5 - 0,75 l/ha de bromoxinil + 0,75 l de MCPA) desde 5 cm de altura hasta que aparezca el primer botón floral.
Maní			Puede mezclarse con 2,4 DB 40% (1,0 l.)
Pastoreo natural (*) Rastrojo (*)	1 a 1,5 l/ha ó Adama Essentials Bromotril + 2,4 DB 100% 0,5 a 1 + 0,4 a 0,8 l/ha(*)		Para el control de yuyo sapo sólo hasta 15 cm de altura. Para flor amarilla superado el estado de plántula.(*)
Praderas	1,0 - 1,5 l/ha		En praderas naturales y artificiales de 0,5 - 1,0 l/ha de bromoxinil + 0,5 - 1,0 l de 2,4 DB (40%).
Soja (*)	0,4 a 0,6 l/ha(*)		Desde que la soja tiene 3 hojas trifoliadas: dosis 0,4 l/ha. Con mayor desarrollo del cultivo y la maleza, aumenta la dosis hasta 0,6 l/ha(*).

Vid	*(Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*) *(Lamium amplexicaule)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Sunchillo (*Wedelia glauca)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verónica (*Veronica arvensis)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	1,0 - 2,0 l/ha		La aplicación debe hacerse durante la aparición de las malezas sin pulverizar el follaje.

(*) Corresponde al producto de Adama

Información General:

Actúa por contacto bloqueando la fotosíntesis en numerosas latifoliadas.
Es rápidamente destruido en el suelo por los microorganismos.
Para su manipuleo, usar guantes.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar anteojos protectores durante la aplicación y preparación del caldo.
Este producto se degrada en contacto con el suelo. Destruir los envases.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y absorber empleando tierra o arena. En todos los casos, el material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 6 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para su manipuleo, usar guantes. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar anteojos protectores durante la aplicación y preparación del caldo.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 oral aguda: 238 mg/kg (rata hembra)
DL 50 dermal aguda: 1310 mg/kg (rata hembra)
CL 50 inhalación aguda: 0,72 mg/l (rata hembra)

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: 984 mg/kg (rata) / 1200 mg/kg (*)
DL 50 dermal aguda: 2000 mg/kg /rata) / > 2000 mg/kg (*)
CL 50 inhalación aguda: 0,99 mg/l (rata) / > 20 mg/l (*)

Irritación dermal:	Severo irritante / Levemente irritante (*)
Irritación ocular:	Severo irritante /Levemente irritante (*)

(*) Datos para producto de Adama

Antídoto: Aplicar tratamiento sintomático.
Para mayor información, ver el Capítulo Emergencias Médicas por Productos Fitosanitarios.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico / Moderadamente toxico (*)
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico / Ligeramente tóxico (*)
Toxicidad para peces:	Muy tóxico / Muy tóxico (*)

(*) Datos para producto de Adama

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS BROMOTRIL	ADAMA ARGENTINA SA	30009	EC	34,9%	II
MEXTROL	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	33953	EC	34,2%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.