BUTAFENACIL

Marcas comerciales: INSPIRE.

Nomenclatura Química:
butafenacil: 2-cloro-5-(3-metil-2, 6-dioxo-4-trifluorometil-3, 6-dihidro- 2H-pirimidin-1-il)- ácido benzoico 1-aliloxicarbonil-1-metil-etil ester
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirimidindiona.

Uso: defoliante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón	500 - 750 cm3/ha (*) + Aceite mineral refinado que supere el 83% p/v al 1%	Aplicar con un 60 - 70% de cápsulas abiertas y con el resto de las cápsulas en madurez fisiológica.

(*) La dosis mayor se deberá usar cuando las temperaturas son más bajas y el follaje remanente es abundante.
Se recomienda el agregado de 2 a 3 litros/ha de etefon a la dosis recomendada de butafenacil con el fin de acelerar la apertura de cápsulas y el envejecimiento del cultivo. De esta forma se puede anticipar la aplicación de butafenacil y consecuentemente anticipar la cosecha.
Agregar 2 litros/ha de etefon con temperaturas altas mayores a 26 °C y una apertura de cápsulas del cultivo mayor al 60%.
Agregar 3 litros/ha de etefon cuando las temperaturas son más bajas y la apertura de cápsulas del cultivo es menor.
La magnitud de abscisión de las hojas, el desecado y el rebrote dependerán de la senescencia de las mismas, de las condiciones al momento de aplicación y de la dosis utilizada. Al aumentar la dosis se incrementa ligeramente el porcentaje defoliado, pero también incrementa el desecado y disminuye el rebrote (% hojas verdes). No aplicar en horas de fuerte insolación, si existe sequía o probabilidad de lluvia.
A fin de acelerar la apertura de cápsulas y el envejecimiento del cultivo, se recomienda el agregar a la dosis recomendada del producto, 2 a 3 litros/ha del fitorregulador etefon 48 % p/v. De esta forma se puede anticipar la aplicación del producto y consecuentemente anticipar la cosecha.

Información General:

Es un defoliante de acción rápida, especialmente indicado para la defoliación del cultivo de algodón. Produce una desecación de los folíolos de las hojas, originando la abscisión de la hoja en la mayoría de los casos, dependiendo esto de la senescencia de las hojas. Es por este motivo que es muy importante observar el momento de aplicación. También inhibe el rebrote por un tiempo considerable.
Al aumentar la dosis, se incrementa ligeramente el porcentaje defoliado, pero también el desecado y disminuye el rebrote (% de hojas verdes).
Un solo tratamiento produce una rápida defoliación del algodón y controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha como Ipomoea spp., Xanthium spp., Sida spp., Acanthospermun spp., Amaranthus spp., Clavelia bidentis y Physalis viscosa o Camambú.

Se recomienda el agregado de aceite agrícola al 1% para mejorar la aplicación del butafenacil.

Este producto no mostró sensibilidad a bajas temperaturas y a la elevada nubosidad para defoliar el cultivo.
No aplicar en horas de fuerte insolación, si existe sequía o probabilidad de lluvia.

Preparación:
Concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
Agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
Agregar la cantidad necesaria del producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa.
Corroborar que el producto se disuelva correctamente.
Agregar la cantidad requerida de aceite mineral refinado que supere el 83% p/v.
Completar el tanque con agua, hasta el volumen final.
Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION
Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30 – 40 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo y las malezas.
Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre, provisto con un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. El volumen de aplicación deberá ser de 150 - 200 litros de agua por hectárea, trabajando con 2-2.8 bar (30 - 40 lb/pulg2) de presión, para lograr un buen mojado del cultivo de algodón y de las malezas presentes. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
También puede ser aplicado mediante equipos aéreos, utilizando un mínimo de 50 litros de agua por hectárea. Es importante asegurar que no se produzca deriva a los cultivos adyacentes, evitando aplicaciones cuando existan vientos que puedan provocarla. Debe utilizarse el equipo correctamente calibrado para proporcionar un alcance preciso y uniforme y para minimizar la deriva potencial.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.
Manejo de la deriva: No permitir que durante la aplicación terrestre se produzca deriva hacia terrenos cercanos, ya que este producto puede dañar seriamente a los cultivos allí presentes. Tomar todas las medidas de precaución necesarias para reducir la deriva, siguiendo las siguientes instrucciones: 1) No aplicar si la velocidad mínima de viento supera los 15 km/hora. 2) Tener extrema cautela cuando las condiciones son favorables para la deriva (ej.: altas temperaturas, baja humedad relativa). 3) Otras reducciones de la deriva pueden ser obtenidas utilizando picos o pastillas que provean un tamaño de gota uniforme, con un tamaño medio de gotas de 250 a 400 micrones (VMD). No utilizar picos o pastillas que proporcionen gotas extremadamente pequeñas ya que son propensas a producir deriva. Aplicar lo más cerca del cultivo posible manteniendo una adecuada cobertura.

ADITIVOS
Para lograr la máxima acción defoliante, se recomienda aplicarlo acompañado de aceite mineral refinado que supere el 83% p/v en una concentración del 1 % v/v (1 litro/100 litros de caldo).

RESTRICCIONES DE USO
Periodo de carencia: Dejar transcurrir al menos 15 días entre la última aplicación y la cosecha de algodón. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No es conveniente recorrer un cultivo tratado, sin la protección adecuada, hasta que no haya transcurrido como mínimo un lapso de 3 días desde el tratamiento.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
El producto formulado pertenece al grupo E de los herbicidas.

Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

COMPATIBILIDAD
No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

FITOTOXICIDAD
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de algodón, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. En todos los casos, el material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral para ratas: >5000 mg/kg.
DL 50 dermal para ratas: >4000 mg/kg

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para peces por lo que se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en la superficie, dejando una franja de seguridad de 5 metros.
No contamine forrajes, estanques ni cursos de agua. Evite la deriva durante las aplicaciones.
Irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal.
Aplicar terapia sintomática.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
INSPIRE	SYNGENTA AGRO	33618	EC	10%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.