CAPTAN

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS MERPAN - ORTHOCIDE 80 WP.

Nomenclatura Química:
captan: N-(triclorometilthio)cicloex-4-ene-1,2-dicarboximidae
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ftalamida.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: fungicida (de suelo, foliar y de post-cosecha.).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Almácigos	Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Mal de los almácigos (*Sclerotinia spp.)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*	180 g/hl	7	Antes de sembrar, efectuar riegos con 5 - 10 litros de agua/m2. Dejar orear y sembrar. Si después de la germinación aparece la enfermedad, regar hasta que el líquido penetre a 1 cm de profundidad.
Almendro Cerezo Ciruelo	Mal de la munición (*Stigmina carpophila)*	150 g/hl	14	Primera: al hincharse las yemas. Segunda: al caer los pétalos. Tercera: cuando el fruto tiene el tamaño de una avellana. Seguir las aplicaciones cada 15 - 20 días si las condiciones del tiempo favorecen el desarrollo de la enfermedad. Realizar una última aplicación a la caída de las hojas para reducir el inóculo en el período siguiente.
	Podredumbre morena de los frutales (*Monilinia fructicola)*	145 g/hl		Al cuajar el fruto y repetir hasta 30 días antes de la maduración.
Apio Perejil	Viruela del apio (*Cercospora apii)*	150 g/hl	7	Aplicar cada 15 días si las condiciones de ambiente favorecen el desarrollo de la enfermedad.
Batata o boniato	Peste negra de la batata (*Plenodomus destruens)*	300 g/hl		Desinfección de plantines: agregar al agua donde son mojados y al agua con que se prepara el barro para embarrarlos. Tratar y plantar inmediatamente después de arrancados. Mantener el caldo en continua agitación para evitar que las partículas del fungicida sean arrastradas por la tierra al fondo del recipiente. Renovar el caldo cada 500 o 1.000 plantines y limpiar la batea donde se efectúa la operación.
Berenjena	Tizón de la berenjena (*Phomopsis vexans)*	145 g/hl o 2 kg/ha		Aplicar cada 10 - 15 días.
Cebolla	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	150 g/hl		Cuando las condiciones del tiempo favorecen el desarrollo de la enfermedad.
Cítricos o citrus	Podredumbre del pie de los citrus (*Phytophthora citrophthora)*	290 g/hl	14	Pulverizar los troncos desde su base hasta una altura de 1 - 1,50 metros antes de las lluvias invernales y repetir a las 10 semanas.
	Sarna del naranjo dulce (*Sphaceloma fawcettii var.viscosa)*	180 g/hl		Al iniciarse la floración y al cuajar el fruto.
Clavel	Mancha gris del clavel (*Alternaria dianthicola)*	110 g/hl	-	Mínimo de 2 aplicaciones después del trasplante, con intervalos de 10 días.
	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*			Antes de que comience y durante la floración.
Crisantemo	Roya del crisantemo (*Puccinia tanaceti)* Tizón del brote (*Didymella ligulicola)*	70 g/hl		En cultivos bajo cubierta y al aire libre, cada 10 días, mojando bien la cara inferior de las hojas.
Dalia Hortensias Peonias Tulipán	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	145 g/hl		Cuando las plantas o brotes tienen 10 - 12 cm de altura, 2 aplicaciones como mínimo.
Damasco Duraznero	Mal de la munición (*Stigmina carpophila)*	150 g/hl	14	Primera: al hincharse las yemas. Segunda: al caer los pétalos. Tercera: cuando el fruto tiene el tamaño de una avellana. Seguir las aplicaciones cada 15 - 20 días si las condiciones del tiempo favorecen el desarrollo de la enfermedad. Realizar una última aplicación a la caída de las hojas para reducir el inóculo en el período siguiente.
	Podredumbre morena de los frutales (*Monilinia fructicola)*	145 g/hl		Al cuajar el fruto y repetir hasta 30 días antes de la maduración.
	Sarna de los frutales de carozo (*Fusicladium carpophilum)*	150 - 180 g/hl		Cuando el fruto tiene 1 cm de diámetro. Repetir a los 10 - 15 días. Se recomienda el uso de captan en alternancia con otros fungicidas que provocan la aparición de formas resistentes.
	Torque (*Taphrina deformans)*	180 g/hl		Al hincharse las yemas. A la caída de las hojas efectuar otra aplicación en mezcla con fosmet: 85 g cada 100 litros de agua.
Frutilla	Hongos del suelo	200 - 250 g/hl	5	

	(*Botrytis spp.)*			Aplicar cada 5 - 10 días desde que las condiciones del tiempo favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
	Quemadura de la hoja de la frutilla (*Diplocarpon earlianum)*	180 - 200 g/hl		
	Viruela de la frutilla (*Ramularia tulasnei)*	100 - 200 g/hl		
Gladiolo	Viruela del gladiolo (*Septoria gladioli)*	110 g/hl	-	Tratamiento repetido semanalmente.
Manzanas (tratamiento post cosecha) Peras (tratamiento post cosecha)	Moho azul de los frutales de pepita (*Penicillium expansum)*	180 - 200 g/hl 200 g/hl (*)		Tratamiento post cosecha en galpones de empaque. Aplicar en baños de fruta o en "drencher": tratamiento por pulverización, mediante barra aspersora sobre las líneas de empaque; se debe aplicar en un solo baño o pulverización. No es necesaria la reiteración del tratamiento. Comenzar lavando con abundante agua de pozo al ingreso de la fruta del campo, si corresponde esta práctica. Dependiendo del método de tratamiento adoptado se recomienda drenar los bines con la concentración de uso recomendada o aplicar el fungicida directamente en la línea de empaque. El nivel de residuos resultante de los diferentes tratamientos post cosecha a utilizar en los empaques nunca deberá superar la cantidad de 3 ppm (3 mg/kg), que es el LMR autorizado por el SENASA. Finalmente secar la fruta tratada a temperatura moderada. Renovar la suspensión de captan frecuentemente.
	Podredumbre de los racimos (*Botrytis spp.)* Podredumbre verde (*Penicillum spp.)* Podredumbres de los frutos (*Diplodia spp.)* Podredumbres de los frutos (*Phomopsis spp.)* Podredumbres de los frutos (*Cladosporium spp.)* Podredumbres de los frutos (*Monilinia spp.)*	180 - 200 g/hl		
Manzano	Podredumbre amarga de la manzana (*Colletotrichum gloeosporioides)* Podredumbre negra del manzano (*Physalospora obtusa)*	150 g/hl	14	Acción preventiva y curativa.
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*			Acción preventiva y curativa. Comenzar las aplicaciones al hincharse las yemas florales. Segunda: cuando asomen las puntas de los pétalos. Tercera: repetir a la caída de los pétalos e inicio del cuaje. Repetir nuevamente si las condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad.
Melón Pepino Sandía Zapallo criollo	Antracnosis de las cucurbitáceas (*Colletotrichum lagenarium)* Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	150 g/hl o 2,7 kg/ha	7	Cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 7 - 10 días.
Papa	Hongo del suelo (*Rhizoctonia solani)*	630 g/l		Tratamiento preventivo para papa semilla. (Sumergir durante 1 minuto (2-3 Tn/100 L), dejar orear y plantar. (**))
	Mosca de la semilla (*Hylemya cilicrura)*	6 kg + 94 kg de diatomea.		Tratar la papa inmediatamente después del corte con una mezcla de 6 kg de Captan 80% + 94 kg de Diatomea molida fina (malla 325); aplicar dicha mezcla a la dosis de 0,5 a 1 kg cada 100 kg de papa. Resulta ser un tratamiento preventivo para el ataque de la mosca de la semilla.
	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,2 - 1,5 kg/ha		Desde que la planta tiene 15 cm de altura cada 7 - 10 días o después de cada lluvia. Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma que hubiera. Mojar bien toda la planta (no menos de 600 l/ha)
Peral	Sarna del peral (*Venturia pirina)*	150 g/hl	14	Comenzar las aplicaciones al hincharse las yemas florales. Segunda: cuando asoman las puntas de los pétalos. Tercera: repetir a la caída de los pétalos e inicio del cuaje. Repetir si las condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad. Su acción es preventiva.
Pimiento	Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*	145 g/hl o 2 kg/ha	7	Cuando las condiciones ambientales (humedad, temperatura) favorecen el desarrollo de la enfermedad, aplicar cada 10 - 15 días.
Rosales	Mancha negra del rosal (*Diplocarpon rosae)*	145 g/hl		Aplicar al aire libre.
		70 g/hl		Bajo vidriera.
Tabaco	Moho azul del tabaco (*Peronospora tabacina)*	150 - 180 g/hl	14	En el almácigo, pulverizar 2 - 3 veces por semana hasta el trasplante.
Tomate	Antracnosis del tomate (*Colletotrichum phomoides)* Mildiu del pimiento y del tomate (*Phytophthora capsici)* Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*	150 g/hl o 2,7 kg/ha	7	En el almácigo y después del trasplante, cada 7 días y cuando las condiciones de ambiente favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	180 g/hl	25	Desde que los brotes tienen 8 - 10 cm de largo hasta que la fruta comience a ponerse pintona. Repetir después de cada lluvia.

(*)Recomendaciones para producto formulado ADAMA ESSENTIALS MERPAN
(**) Recomendaciones para producto formulado ORTHOCIDE 80 WP

Información General:

Fungicida que actúa en forma preventiva o cuando aparecen los primeros síntomas (y curativamente en el caso de sarna del manzano). Su acción protectora es valorizada especialmente en variedades de manzanas y peras sensibles a otros fungicidas. Mejora el "acabado" de la fruta.
Es muy estable, salvo en medio alcalino.

Técnica de aplicación: emplear un mínimo de 600 l/ha; en árboles frutales el volumen no debe ser inferior a 1.500 l/ha, dependiendo del sistema de plantación y del porte de la planta.

Caudal: asegurar siempre un buen cubrimiento hasta el punto de goteo.
Tipo de pastilla: preferentemente del tipo cónico.
Presión de trabajo: 300/400 lb/pulg2 en árboles frutales y 50 - 80 lb/pg2 en otros cultivos.
Número y tamaño de gotas: 70 - 100/cm2 de 100 - 200 micrones.

Condiciones y advertencias especiales: NO aplicar con vientos > 10 km/h.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. Se excluye cualquier otro producto o material fuertemente alcalino (Polisulfuro de calcio y Caldo Bordelés) y la mezcla con aceites minerales o insecticidas emulsionables.
Restricciones de uso: dejar transcurrir 3 semanas entre un tratamiento con este tipo de productos y la aplicación de captan. No mezclar con productos emulsionables sin comprobar previamente que la mezcla es estable y carece de efecto fitotóxico.

Inactivación: humedecer con soda cáustica al 10%.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar el agua de lavado para su posterior eliminación.

Clasificación (modo o sitio de acción): M4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del formulado 83%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 0,76 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Del producto formulado 80%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 6000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,23 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios
Mientras espera la llegada del médico, retirar al intoxicado del área de aplicación, quitar la ropa contaminada y lavar la piel y el pelo con abundante agua. En caso de ingestión suministrar abundante agua. Si se contaminan los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas agudos: dolor abdominal, diarrea, náuseas.

Riesgos ambientales: en las condiciones de uso no afecta la vida silvestre. Toxicidad en abejas: Virtualmente no tóxico. Toxicidad para peces: altamente toxico. Toxicidad para aves: levemente toxico; no impide su reproducción.
NO aplicar sobre fuentes o espejos de agua, ni contaminarlos con aguas provenientes del enjuague de equipos de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS MERPAN	ADAMA ARGENTINA SA	31052	WP	83%	III
ORTHOCIDE 80 WP	UPL ARGENTINA S.A.	31302	WP	80%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.