CARBOXIN + TIRAM

Marcas comerciales: VITAVAX FLO SEMILLERO - VITAVAX FLO TS.

Nomenclatura Química:
carboxin: 5,6 dihidro - 2 - metil - 1,4 oxatiin- 3 - carboxanilida.
tiram: bisulfuro de tetrametil tiocarbamilo.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carboxamida + ditiocarbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Cabeza negra (*Helminthosporium allii)* Carbonilla (*Aspergillus niger)* Mancha herrumbre (*Fusarium oxysporum var. cepae)* Podredumbre verde (*Penicillum spp.)*	500 a 1000 cm3/100 l de agua		Sumergir durante 15 minutos. Usar dosis mayor para los que presenten mayor infección
		500 cm3/100 kg de semilla.		Agregar de 500 a 1000 cm3 de agua, para una mejor distribución.
Alcaucil Frutilla	Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia solani / pythium spp.)* Mal de los almácigos (*Pythium spp.)*	500 cm3/100 l de agua		Sumergir los plantines durante el trasplante.
Algodón	Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia solani)*	400 cm3/100 kg de semilla.		
Arroz	Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia solani)* Helmintosporiosis del arroz (*Helminthosporium oryzae)*	250 cm3/100 kg de semilla.		
Avena Cebada	Carbón cubierto (*Ustilago hordei)* Carbón volador (*Ustilago nuda)*			
Forestales Frutales Viñedos	Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Cancrosis de los frutales (*Botryosphaeria spp)* Estéreo purpúreo (*Chondrostereum purpureum)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)* Plomo de los frutales (*Stereum purpureum)*	1000 cm3		Tratamientos de cortes de poda: diluir la dosis recomendada en 1 litro de agua o pintura al látex en base de agua y pintar cortes y heridas.
Girasol Maní Soja	Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*	250 cm3/100 kg de semilla.		Tratamiento húmedo de semillas, hasta un año antes de la siembra.
Maíz	Carbón de la espiga del maíz (*Sphacelotheca reiliana)* Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp., aspergillus spp, penicillium spp)*			
Papa	Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*	1000 cm3/100 l de agua		Tratamiento por inmersión de tubérculos, plantines o semillas. Sumergir tanto tubérculos cortados como enteros.
Pimiento	Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia solani)*	400 cm3/100 kg de semilla.		
		500 cm3/100 l de agua		Sumergir los plantines durante el trasplante.
	Mal de los almácigos (*Pythium spp.)*			
Poroto	Damping off o Mal de los almácigos (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.; aspergillus spp.; alternaria spp.)*	250 cm3/100 kg de semilla.		
Trigo	Carbón cubierto del trigo			

	(*Tilletia caries*) Carbón volador (*Ustilago nuda*)			

Información General:

Modo de acción: es un producto que actúa interfiriendo en los procesos respiratorios del hongo, afectando tanto a los hongos presentes en la semilla como a los existentes en el suelo y ejerciendo un amplio control sobre enfermedades ocasionadas.Es un estimulante de crecimiento actuando en el metabolismo del nitrógeno, con acción de contacto multisitio. Incrementa la absorción de nitratos y favorecen a la inducción de la enzima nitrato-reductasa.

Periodo de carencia: no corresponde, uso posicionado.
Tiempo de reingreso al área tratada: no corresponde, uso posicionado.

Compatibilidad: puede utilizarse con otros fungicidas, insecticidas e inoculantes. Previamente se recomienda hacer una prueba de compatibilidad correspondiente.
Es selectivo, no perjudica el desarrollo de hongos benéficos como las Trichodermas.
No aplicar con productos de reacción alcalina.

Instrucciones para el uso:
Preparación: es un preparado de aplicación directa listo para su aplicación, para el tratamiento de semillas y debe aplicarse mecánicamente en forma de empastado. Es conveniente agitar antes de utilizar el producto.
Puede ser aplicado sobre la semilla directamente o previamente diluido en una a dos partes de agua. También puede aplicarse con inoculantes para leguminosas.
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla, de esta manera se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema rotativo de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio. No se recomienda el mezclado en el cajón de la sembradora.
Para una mejor distribución y eficacia del producto se recomienda que la semilla se encuentre limpia y clasificada. El tratamiento de semillas con un alto porcentaje de daño mecánico y/o bajo vigor o calidad puede afectar el proceso de germinación y/o reducir el vigor de la plántula. En caso de dudas, se aconseja realizar antes un test de germinación con una pequeña porción de semillas.

Restricciones de uso: no debe pastorearse o alimentarse ganado hasta transcurridas siete semanas desde la siembra. Se debe tener especial cuidado con el manejo de semilla tratada. La semilla tratada no debe utilizarse como alimento, forraje o para la extracción de aceite.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. En caso de derrame del producto, crear una barrera de contención del derrame. Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y animales. Cubrir el producto derramado con cal y luego con un material adsorbente (arena, tierra, aserrín etc). Barrer, recoger con una pala, y colocar en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto. Seguidamente, proceder a lavar con detergente y un poco de agua el área contaminada.
Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, guantes de goma de nitrilo impermeables, gafas protectoras y botas de goma, camisa de mangas largas con pantalones largos o bien mameluco de mangas largas.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >6000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 10000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 20 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Muy tóxico para peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VITAVAX FLO SEMILLERO	UPL ARGENTINA S.A.	33816	FS	20% + 20%	IV
VITAVAX FLO TS	UPL ARGENTINA S.A.	33636	FS	20% + 20%	IV

VITAVAX FLO SEMILLERO ha sido especialmente formulado sin colorante para incorporar un color a elección, exclusivo para semilleros.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.