CIANAMIDA HIDROGENADA

Nomenclatura Química:
Cianamida hidrogenada estabilizada.
Clasificación Química: ácido carbámico.
Acción: de contacto.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Vid	5 l/hl	Aplicar 30 a 45 días antes de la fecha normal de brotación. Mojar bien los cargadores hasta punto de escurrimiento. El volumen pulverizado por hectárea depende de la edad y del sistema de poda de los viñedos, aunque generalmente una cobertura de 1000 l/ha es suficiente.

Información General:

Es un regulador de crecimiento para interrumpir la dormancia invernal y estimular la brotación temprana y uniforme de las yemas de diversas especies de plantas como vid. Puede usarse en todas las variedades de uva, especialmente en aquellas de brotación irregular. Adelanta la brotación, el desarrollo vegetativo y la cosecha. Uniforma la brotación y el desarrollo vegetativo, por lo tanto facilita y mejora la eficiencia de las labores culturales, aplicaciones de plaguicidas y reguladores de crecimiento. Produce una brotación completa en las yemas, desde la base hasta la punta del cargador y aumenta los rendimientos.

Equipos: se pueden usar las mochilas manuales o de motor, los montados sobre tractor y los de arrastre. Después de la aplicación, lavar inmediatamente el equipo pulverizador con abundante agua. El pH óptimo del agua es de 6 a 7. La cianamida no diluida es corrosiva.

Indicaciones complementarias: mojar las plantas hasta punto de escurrimiento, procurando que todas las yemas sean tratadas. Se debe asegurar una buena y uniforme cobertura de la plantación. El volumen total de la preparación a usar depende del tipo de poda, edad (tamaño) y densidad del cultivo.
Se debe aplicar durante el receso invernal.
Considerando la diversidad de climas, la época de aplicación se debe adaptar a las condiciones locales.
En zonas donde existe peligro de heladas, evitar las aplicaciones de cianamida, o bien aplicar más tarde.
Evitar la deriva de cianamida a cultivos vecinos, ya que es fitotóxico en tejidos verdes. El reingreso al área tratada se hará en cuanto se hayan secado las gotas de la pulverización.
Se recomienda efectuar solamente una aplicación por temporada.

Restricciones de uso: no tiene. Se recomienda mantener alejados los animales domésticos durante la aplicación.

Compatibilidad: se recomienda aplicar solo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda (rata): 300 mg/kg.
DL 50 dermal aguda (conejo): 1700 mg/kg.
CL 50 (4h) para ratas: >13 mg/l.

Primeros auxilios: el producto puede ser mortal si es ingerido. Puede producir irritación a la piel y ojos.

Si es ingerido accidentalmente, NO se debe provocar el vómito. Hacer un lavado gástrico, con cuidado, para impedir la aspiración.
Salpicaduras en ojos: lavar con abundante agua. Conseguir ayuda médica inmediatamente.
Salpicaduras en la piel: lavar bien con agua y jabón.
En caso de inhalación retirar al afectado al aire fresco.
Si es necesario efectuar respiración artificial.

Riesgos ambientales: Tóxico para abejas y peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.