CIPERMETRINA + CLORPIRIFOS

Marcas comerciales: LORSBAN PLUS.

Nomenclatura Química:
cipermetrina: Mezcla (1/1) de isómeros cis-trans de a-ciano-3-fenoxibencil-2,2-dimetil 3-(2,2 diclorovinil) ciclopropano carboxilato.
clorpirifos: 0,0 - dietil-0-3,5,6- (tricloro-2-piridinil)fosforotioato.
Clasificación Química: piretroide + organofosforado.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo Cebolla Hortícolas	Trips de la cebolla (*Thrips tabaci)*	150 cm3/hl	21	Cuando se detecten los primeros focos de ataque.
Alfalfa	Gusano cortador (*Euxoa spp.)* Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	350 - 450 cm3/ha	14	Pre y post-emergencia del cultivo. Durante el atardecer y/o por la noche.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	250 cm3/ha		Cuando se recojan 60 a 100 isocas por cada 20 golpes de red.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	300 cm3/ha		Cuando se detecten los primeros focos de ataque.
	Tucuras (*Scyllinops spp.)* Tucuras (*Dichroplus spp.)*	350 - 450 cm3/ha		
Algodón	Chinche rayada (*Horcias nobilellus)*	200 - 300 cm3/ha	21	Cuando se recojan 10 a 15 chinches por cada 100 golpes de red. Usar las dosis menores en presencia de ninfas y las mayores para control de adultos.
	Gusano cogollero (*Heliothis virescens)* Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	600 cm3/ha		Cuando se registren 20 orugas cada 100 plantas, o un 7 - 10% de pimpollos dañados y en aumento.
	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	150 - 200 cm3/ha		Cuando se registren 2 - 4 larvas mayores de 1,5 cm por planta.
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Guindo Pelón	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)*	150 cm3/hl	25	Según servicio de alarma o aparición de la plaga.
Girasol	Gusano cortador (*Euxoa spp.)* Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	350 - 450 cm3/ha	30	Pre y post-emergencia del cultivo. Durante el atardecer y/o por la noche.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	400 cm3/ha		Cuando se observen 4 - 5 isocas por planta.
Hortalizas (papa, tomate, pimiento, berenjena, etc)	Trips (*Thrips spp.)*	150 cm3/hl	21	Cuando se detecten los primeros focos de ataque.
Lino	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	500 cm3/ha	30	Cuando se recojan 50 isocas cada 100 golpes de red.
Maíz	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	600 cm3/ha		Soja de 1ra. con 30% de brotes atacados. Soja de 2da. con 10 - 20% de brotes atacados. A partir de floración, al notar los primeros daños en flores y vainas.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)*	750 cm3/ha		A partir de la floración, cuando se observen 2 chinches por metro lineal de surco.
	Chinche verde (*Nezara viridula)*	550 - 650 cm3/ha		
	Gusano cortador (*Euxoa spp.)* Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	350 - 450 cm3/ha		Pre y post-emergencia del cultivo. Durante el atardecer y/o por la noche.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	300 cm3/ha		Cuando se observen 15 isocas por metro lineal de surco y más del 20% de defoliación.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	350 cm3/ha		

	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*			
Pimiento Tomate	Polilla del tomate (*Scrobipalpula absoluta)* Polilla del tomate (*Gnorimoschema operculella)*	150 cm3/hl	21	Efectuar tratamientos preventivos desde el transplante cada tres semanas. En ataques intensos, repetir cada dos semanas.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	600 cm3/ha	45	Soja de 1ra. con 30% de brotes atacados. Soja de 2da. con 10 - 20% de brotes atacados. A partir de floración, al notar los primeros daños en flores y vainas.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)*	750 cm3/ha		A partir de la floración, cuando se observen 2 chinches por metro lineal de surco.
	Chinche verde (*Nezara viridula)*	550 - 650 cm3/ha		
	Gusano cortador (*Euxoa spp.)* Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	350 - 450 cm3/ha		Pre y post-emergencia del cultivo. Durante el atardecer y/o por la noche.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	300 cm3/ha		Cuando se observen 15 isocas por metro lineal de surco y más del 20% de defoliación.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	350 cm3/ha		
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*			

Información General:

El producto contiene un insecticida órganofosforado (clorpirifos) y un piretroide (cipermetrina). Esta combinación le confiere poder de volteo y eficacia en el control de las plagas mencionadas en las recomendaciones de uso. Actúa por contacto, ingestión y en fase vapor. Es apto para ser usado con equipos aéreos y terrestres de alto y bajo volumen.

No es fitotóxico para los cultivos que se recomienda. Es compatible con otras formulaciones emulsionables, con excepción de productos que tienen reacción alcalina como polisulfuro de calcio.

Equipos y volúmenes de aplicación:
a) Terrestres convencionales, con volumen no inferior a 50 l/ha
b) Aéreo, no menos de 10 l/ha, cuando se mezcla con agua.
c) No menos de 3 l/ha cuando es diluido con gasoil

Cuando se utiliza gasoil, 5 l/ha. Programar la aplicación para obtener un cubrimiento de 50-70 gotas/cm2.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Máscara con filtro para productos organofosforados.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo clorpirifos
DL 50 oral aguda en rata macho y hembra: 223 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 5000 mg/kg.

Del principio activo cipermetrina
DL 50 oral aguda, en rata en suspensión acuosa 4120 mg/kg.; en aceite de maíz, 1740 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo, sin diluir, > 2400 mg/kg.

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en ratas, 245 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 4360 mg/kg.

Primeros auxilios
En caso de ingestión: no inducir el vómito. Llamar de inmediato al médico.

Antídoto: atropina inyectable.

Riesgos ambientales: altamente tóxico para abejas. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de colmenas. Moderadamente tóxico para aves. Extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LORSBAN PLUS	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	30742	EC	5% + 50%	II