CYPROCONAZOLE

Marcas comerciales: ALTO 10 SL.

Nomenclatura Química:
cyproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(I H-1,2,4-triazol-1-il)-butano-2-ol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	400 - 500 cm3/ha	15	Aplicar ante condiciones predisponentes o a la aparición de los primeros síntomas. El número de aplicaciones por temporada es variable entre 2 a 3, dependiendo de condiciones ambientales (elevada temperatura y humedad ambiente) para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar la dosis menor en forma preventiva y ante condiciones de ataques leves; o cuando el clima se presente seco. Usar la dosis mayor ante condiciones de ataque severas y/o tiempo húmedo.
Soja	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	300 cm3/ha	20	Debe ser aplicado antes del desarrollo de la enfermedad para el control de la roya de la soja. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten se deberá repetir la aplicación a partir de los 14 días. La roya de la soja es agresiva y de desarrollo muy rápido. Ante la ocurrencia de condiciones predisponentes monitorear el lote y realizar las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas, antes de que la enfermedad alcance el 2% de severidad en las hojas del tercio inferior de la planta. No se recomienda aplicar este producto cuando la enfermedad ya se haya desarrollado dentro del cultivo.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)*	600 - 800 cm3/ha	30	Se recomienda la aplicación en hoja bandera. Intervalo entre aplicaciones: entre 15 a 20 días. El número de aplicaciones por temporada es variable entre 2 a 3, dependiendo de condiciones ambientales (elevada temperatura y humedad ambiente) para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar la dosis menor en forma preventiva y ante condiciones de ataques leves; o cuando el clima se presente seco. Usar la dosis mayor ante condiciones de ataque severas y/o tiempo húmedo.

Información General:

Fungicida sistémico para el control de enfermedades en los cultivos de maní, soja y trigo. Cyproconazole penetra muy rápidamente en los tejidos vegetales, absorbiéndose en menos de una hora. Una vez en el interior del vegetal, se distribuye en forma homogénea, quedando la planta debidamente protegida. Gracias a las propiedades del cyproconazole, que actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol de las membranas celulares, brinda un control preventivo y curativo, con una buena acción erradicante de los patógenos que causan enfermedades de importancia económica en los cultivos de maní, soja y trigo.

Preparación: concentrado soluble en agua.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. - Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr entre 20 y 30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Se puede aplicar con cualquier tipo de equipo terrestre, empleando volúmenes de 200-300 l/ha de agua, con una presión de 60-80 lb/pulg2. Utilizar picos de cono hueco para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 20-30 l/ha.
NO usar en aplicaciones aéreas con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Aplicar lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.

Recomendaciones de uso: se recomienda comenzar las aplicaciones de cyproconazole a la aparición de condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad, o bien ante la aparición de los primeros síntomas de ataque. Los mejores resultados se obtendrán cuando el cultivo se encuentre con buen crecimiento, sin estar afectado por sequía, heladas o insectos. Evitar aplicaciones ante la presencia de abundante rocío, altas temperaturas, baja humedad. No aplicar con condiciones de viento de más de 10 km/h.

Restricciones de uso:
Período de carencia: dejar los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha, según el cultivo: trigo: 30 días; soja: 20 días; maní: 15 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA RESISTENCIA
La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad: se puede mezclar con la mayoría de los productos agroquímicos, no recomendándose hacerlo con productos a base de cobre. Sin embargo, ante la diversidad de productos existentes en el mercado, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad de ningún tipo en los ensayos realizados a lo largo de varias campañas para los cultivos registrados. Se deben seguir las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4496 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 4,93 mg/l

Leve irritante dermal. Moderadamente irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática. No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Solvente: polietilenglicol.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para aves.
Evitar la presencia de aves en el área de aplicación y el contacto de las mismas con el producto.
Prácticamente no tóxico para peces.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de fuentes de agua ni forrajes.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ALTO 10 SL	SYNGENTA AGRO	32400	SL	10%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.