CLODINAFOP - PROPARGYL + CLOQUINTOCET - MEXYL

Marcas comerciales: GIZMO - PROA - TOPIK 24 EC.

Nomenclatura Química:
clodinafop-propargyl: 2[4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridoloxi)-fenoxi]ácido propiónico
cloquintocet-mexyl: 2-heptil-5-cloro-8-quinolinoxi acetato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ariloxi-fenoxipropionato + éster ariloxiacético.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (*Avena fatua)*	150 cm3/ha	(**)	Aplicar en post-emergencia del cultivo, con malezas entre 2-4 hojas hasta inicio de macollaje, en condiciones de activo crecimiento.
	Ryegrass (*Lolium multiflorum)*	200 - 250 cm3/ha (*)		

(*) Se debe usar la dosis máxima recomendada cuando las condiciones para el activo crecimiento de las malezas no son totalmente favorables, o el tamaño de las mismas es mayor al recomendado.
(**) Exento para el uso posicionado como herbicida post-emergente del cultivo de trigo. Para trigos que serán pastoreados deberán transcurrir entre la aplicación y el pastoreo como mínimo 45 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Herbicida post-emergente de acción sistémica, selectivo para el cultivo de trigo. Controla malezas como Avena fatua y Lolium multiflorum. Se absorbe a través de las hojas y es traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas. Para lograr un buen resultado, es importante que las malezas se encuentren en estado de activo crecimiento, con un tamaño adecuado, y que se presenten buenas condiciones tanto de humedad de suelo, como de temperatura ambiente. Pocos días después de la aplicación, las plantas presentan coloración amarillenta, sobre todo en las hojas superiores, que luego tornan a violáceo, pronunciándose más adelante hasta marchitamiento, necrosis y muerte de la planta. La acción del producto se nota por la facilidad con que se desprenden las hojas terminales (hojas nuevas) ante una leve tracción.

Preparación: concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
-Agregar el aceite mineral refinado 90%, de acuerdo a las recomendaciones.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 30 - 40 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. En aplicaciones terrestres se recomienda aplicar con un volumen de agua de 120 - 150 l/ha, presión de 40 - 50 lb/pulg2 y pastillas de abanico plano (8002; 8003; 11002; 11003).

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Aditivos: debe aplicarse con el agregado de aceite mineral refinado 90% en una concentración de 0,5 a 1 litro cada 100 litros de agua.

Recomendaciones de uso: debe ser aplicado en post-emergencia de las malezas y el cultivo, con condiciones adecuadas para el activo crecimiento y adecuada humedad del suelo. Es importante tener en cuenta el tamaño de Avena fatua y Lolium multiflorum. En el momento de la aplicación, éstas deben tener de 2 a 4 hojas hasta inicio de macollaje (Zd 12 - 14 - 21 - 22). Malezas ya macolladas tendrán control parcial y pueden rebrotar disminuyendo la calidad del tratamiento. Aplicaciones tempranas evitan que la maleza ejerza competencia sobre el cultivo. Asimismo debe observarse que todas las plantas de malezas estén emergidas, nacimientos posteriores a la aplicación no serán controlados.

No es recomendable realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo estrés hídrico, ni cuando haya rocío sobre el follaje. No realizar aplicaciones con posibilidad de heladas inminentes, la ocurrencia de heladas en forma inmediata luego de la aplicación pueden provocar amarillamiento y retraso en el desarrollo del cultivo. No realizar aplicaciones sobre cultivos que estén sufriendo estrés por sequía, deficiencia nutricional, heladas o ataques de plagas.

Restricciones de uso:
Rotaciones: debido a que este producto no posee acción residual, una vez levantadas la cosecha, puede continuarse con las rotaciones de cultivo normales en la zona.

Periodo de carencia: exento para el uso posicionado como herbicida post-emergente del cultivo de trigo. Para trigos que serán pastoreados deberán transcurrir entre la aplicación y el pastoreo como mínimo 45 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
El producto formulado pertenece al grupo A de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: no se recomienda la mezcla de tanque de este producto con herbicidas que controlan malezas de hoja ancha en el cultivo de trigo (hormonales, sulfonilureas, herbicidas de contacto). En caso de tener que utilizar alguno de ellos, deberá aplicarse primero este producto y dejar pasar aproximadamente 5 - 7 días para realizar el tratamiento con el herbicida latifolicida. No aplicar este producto en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. En casos de ocurrencia de heladas fuertes posteriores a la aplicación, puede observarse un leve amarillamiento en las hojas del cultivo. No realizar aplicaciones sobre cultivos que estén sufriendo estrés por sequía, deficiencia nutricional, heladas o ataques de plagas.
es de plagas.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC) + 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL50 oral aguda: > 2231 mg/kg (rata).
DL50 dermal aguda > 4000 mg/kg (rata).
CL50 inhalatoria: > 3,5 ml/l

Moderado Irritante dermal y ocular. Puede causar sensibilización cutánea por contacto.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de aplicación y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para las abejas.
Evitar la presencia de las mismas durante la aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de forrajes y plantas deseables, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GIZMO	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	36882	EC	24% + 6%	II
PROA	SYNGENTA AGRO	36741	EC	24% + 6%	III

TOPIK 24 EC	SYNGENTA AGRO	33738	EC	24% + 6%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.