CLOPIRALID

Marcas comerciales: LONTREL.

Nomenclatura Química:
clopiralid: sal monoetanolamina del ácido clopyralid (ácido 3,6-dicloropiridino - 2- carboxílico).
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alpiste Avena común Cebada Centeno Praderas de Gramíneas Trigo	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cardo platense (*Carduus acanthoides)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mostacilla (*Sisymbrium officinale)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Senecio (*Senecio spp.)*	En condiciones buenas, 200 - 250 cm3/ha + 250 - 300 cm3/ha de éster de 2,4-D 100% En condiciones muy favorables, 150 - 200 cm3/ha + 250 - 300 cm3/ha de éster de 2,4-D 100%	7	Pulverizar el cultivo a partir del momento en que tienen 1 o 2 macollos hasta antes de la aparición del primer botón de encañado. En ningún caso después que comience el encañado.
Barbecho químico	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cardo platense (*Carduus acanthoides)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mostacilla	150 a 200 cm3/ha + 250 a 300 cm3/ha de éster de 2,4-D 100%		En aplicaciones de control total mezclar con 2,5 l/ha de glifosato (360 g equivalente ácido por litro).

	(*Sisymbrium officinale)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus raphanistrum)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Senecio (*Sonchus oleraceus)*			
Maíz Sorgo	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cardo platense (*Carduus acanthoides)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mostacilla (*Sisymbrium officinale)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Senecio (*Senecio spp.)*	En aplicaciones dirigidas, 150 - 200 cm3/ha + 250 - 300 cm3/ha de éster de 2,4-D 100%	40	Aplicación con caños de bajada a partir de los 35 - 40 cm y hasta los 65 - 75 cm de altura del cultivo.
		En cobertura total, 100 - 150 cm3/ha + 250 - 300 cm3/ha de éster de 2,4-D 100%		Cuando el cultivo tiene 10 - 15 cm de altura (2 hojas bien desarrolladas) y hasta los 25 cm de altura (6 - 8 hojas).

Nota: se recomienda siempre la mezcla con 2,4-D para acelerar el control de las malezas.
Control parcial: Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula), Manzanilla (Matricaria chamomilla).

Información General:

Es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal recomendado para aplicaciones en post-emergencia.
Controla especialmente malezas compuestas en cereales de invierno, maíz, sorgo, praderas artificiales de gramíneas, campos naturales, en cercos, alambrados, vías férreas, carreteras y barbecho químico.
Es absorbido por las malezas por vía foliar y radicular, y se trasloca hacia los meristemas que es donde ejerce su acción.
Los mejores resultados se obtendrán cuando se pulvericen malezas pequeñas, en estado de crecimiento activo, bajo condiciones de humedad y temperatura favorables para su desarrollo. No es aconsejable pulverizar en condiciones de sequía persistente.
Su uso es selectivo para gramíneas únicamente. No debe aplicarse en cultivos de cereales asociados a leguminosas y otros cultivos latifoliados.
Evitar la deriva sobre cultivos susceptibles como: algodón, girasol, soja, papas, frutales, hortalizas, ornamentales y florícolas, etc.
No hay efectos fitotóxicos en los cultivos que se siembren en lotes tratados en tiempo de rotación normales. En caso de fallas en la siembra no resembrar los lotes tratados con cultivos sensibles (latifoliadas en general, por ej: soja, girasol).

Derrames:

Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.

Delantal.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 47,51%
Toxicidad oral aguda; DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda; DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria: CL50 > 3 mg/L

Irritacion cutánea: Moderado irritante dermal.
Irritacion ocular: Moderado irritante ocular.
Sensibilizacion cutánea: No sensibilizante dermal.
No posee antídoto específico. En caso de intoxicación, realizar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No aplicar sobre cuerpos de agua y evitar la deriva de producto a los mismos. Avisar a los apicultores cercanos para el cierre de colmenas previo a la aplicación.

El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de su etiqueta.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LONTREL	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	33572	SL	47,51%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.