CLORFENAPIR

Marcas comerciales: PIRATE – SUNFIRE 24 SC.

Nomenclatura Química:
clorfenapir: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5- (trifluorometil)-1H-pirrol-3-carbonitril
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirazol.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	830 cm3/ha	(*)	Aplicar cuando se observan 15 - 20 larvas por metro de surco, preferentemente hasta L3 (larvas de 1,5 - 2 cm). En algodón, el uso es posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Soja	Falsa oruga medidora (*Chrysodeixis includens)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga del yuyo colorado (*Spodoptera cosmioides)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	800 cm3/ha	45	Aplicar cuando se observen 10-15 larvas por metro de surco. Larvas con tamaño < 1,5 cm (L2-L3). No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Oruga bolillera *(Helicoverpa gelotopoeon)*	1000 cm3/ha (**) (***)		Aplicar cuando se alcance el umbral de 1 a 2 larvas (L1-L2) /m lineal de surco, con cultivo en estadíos vegetativos tempranos de desarrollo.
	Trips (*Caliothrips phaseoli)*	500 cm3/ha (***)		Aplicar a inicio de infestación de la plaga (al detectar 3 a 5 ninfas/folíolo). (****)
	Acaro tejedor (Tetranychus urticae)	500-800 cm3/ha (**)		Aplicar a inicio de infestación de la plaga (al detectar 3 a 5 ninfas/foliolo)(***) Utilizar la dosis mas alta a mayor incidencia de la plaga en el cultivo. No realizar mas de dos aplicaciones en el ciclo del cultivo.
Tomate	Polilla del tomate (*Scrobipalpuloides absolutus)*	50 cm3/hl de agua.	7	Ante aparición de la plaga. En tomate entre la última aplicación y cosecha deberán transcurrir 7 días y no debe superarse las cinco (5) aplicaciones en todo el ciclo del cultivo.
Maiz Maiz Pisingallo	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda*)	800- 1000 cm3/ha (***)	15	Aplicar cuando se observe 15% de plantas atacadas, preferentemente a inicio de ataque. Utilizar la dosis mayor con alta infestación de la plaga Con la dosis de 800 cc/ha no realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. Con la dosis de 1000 cc/ha realizar solamente una.
	Chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)			Comenzar las aplicaciones a inicio de infestación. Utilizar la dosis mayor con alta infestación de la plaga. Con la dosis de 800 cm3 /ha no realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. Con la dosis de 1000 cm3/ha realizar solamente una. Realizar aplicaciones terrestres a las primeras horas de la mañana o a las últimas de la tarde, asegurando una buena cobertura de aplicación para garantizar el llegado a la plaga objetivo.

(*) Uso posicionado.
(**) Con la dosis de 1000 cc/ha realizar solo una aplicación por ciclo de cultivo.
(***) adicionar coadyuvante (esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal 75%) a razón de 250 cc/ha.

Información General:

Clorfenapir es un acaricida/insecticida que actúa por ingestión y contacto. Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes.

Equipos y formas de aplicación
Para el cultivo de tomate, debe ser aplicado con mochilas de presión manual o motopulverizadoras con mangueras y lanzas de alta presión (entre 80 y 200 lb/pulg2) y el mojado debe ser hasta punto de goteo cubriendo totalmente la planta. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 500 a 2000 l/ha. Para el cultivo de algodón, se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 l/ha. Utilizar pastillas de cono hueco y presión entre 40-60 lb/pulg2. Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga. No realizar aplicaciones con altas temperaturas y baja humedad relativa. Tampoco aplicar cuando haya rocío sobre el follaje.
Para los cultivos de soja y maíz: se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea, con el fin de lograr una buena cobertura (50-70 impactos/cm2). Utilizar presión entre 40-60 lbs/pg2. Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga. Clorfenapir actúa sobre todos los estadíos larvales de Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Chrysodeixis includens y Spodoptera cosmioides, pero se obtiene una eficacia máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadíos larvales de las mismas. Para Helicoverpa gelotopoeon, realizar aplicaciones a inicio de infestación, con plaga expuesta, en estados larvales tempranos de desarrollo (L1-L2) y en los primeros estadíos vegetativos del cultivo.

Para un efectivo control de Caliothrips phaseoli, realizar la aplicación a inicio de infestación.
En el cultivo de maíz, la máxima eficacia de control de Spodoptera frugiperda se alcanzará si se aplica Clorfenapir en inicio de ataque de la plaga (10% de plantas atacadas, con "raspado" de vainas foliares, larvas L1-L2).
En el cultivo de maíz y maíz pisingallo, se recomienda para control de Spodoptera frugiperda (oruga militar tardía/gusano cogollero).

No realizar aplicaciones con altas temperaturas y baja humedad relativa. Tampoco aplicar cuando haya rocío sobre el follaje.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

Preparación
Llenar parcialmente con agua el tanque de la pulverizadora (manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento), agregar la cantidad recomendada de clorfenapir y completar el volumen de agua. NO deje el caldo preparado de un día para otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Para el cultivo de soja, se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea, con el fin de lograr una buena cobertura (50-70 impactos/cm2). Utilizar presión entre 40-60 lbs/pg2. Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga.

Recomendaciones de uso
Se recomienda el agregado de aceite emulsionable en la proporción de 0,3% de aceite en el volumen total del caldo.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente como arena, aserrín, tierra o elementos específicos para contención de derrames y recolecte el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego enjuagar el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 13 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta / protección respiratoria, sombrero, y botas de goma. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 2000 mg/kg

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50: 560 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50: 626 mg/kg

Primeros auxilios

En caso de ingestión: no inducir el vómito. Obtener asistencia médica, si es posible, llevando la etiqueta del producto.

En caso de contacto con la piel: quítese la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua limpia y jabón. Acudir al médico.

En caso de inhalación: retirar la persona afectada del área contaminada. Si es necesario, aplicar respiración artificial.

En caso de contacto con los ojos: enjuáguelos bien con agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación, acudir al médico.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Muy tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos: Extremadamente tóxico

Este producto es altamente tóxico para abejas expuestas a la aplicación directa en cultivos en floración. Aplicación con restricciones. Debe aplicarse en horarios de mínima actividad de las abejas. Siguiendo estas recomendaciones de uso, de acuerdo a estudios realizados, este producto no presenta riesgo toxicológico para la abeja Apis melífera a la dosis máxima recomendada en este marbete.

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Aplicación con restricciones. No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimiento desde áreas tratadas con el producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación puede resultar peligroso para organismos acuáticos. No está autorizada la aplicación aérea de este producto.

Muy tóxico para aves. De acuerdo a la evaluación realizada este producto presenta un riesgo tolerable para las aves, en relación al uso y dosis autorizados por el SENASA e indicados en este marbete.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PIRATE	BASF ARGENTINA	38970	SC	24%	II
SUNFIRE 24 SC	BASF ARGENTINA	33084	SC	24%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.