Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

CLORIDAZON



Nomenclatura Química:
1-fenil-4-amino-5-cloro-piridazona-6 ó 5-amino-4-cloro-2-fenil-3 piridazinona.
Clasificación Química: piridazinona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (preemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga Espinaca	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Cicuta (*Conium maculatum)* Corregüela (*Convolvulus arvensis)* Dichondra, Oreja de ratón (*Dichondra microcalyx)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (*Plantago major)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Poa (*Poa annua)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	3 - 3,5 kg o l/ha	20	Aplicar en pre emergencia de la maleza y del cultivo, es decir poco después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo y malezas. La dosis menor aplicarla en suelos arenosos y la mayor en suelo arcilloso o con elevado contenido de materia orgánica.
Remolacha		3 - 4,5 kg o l/ha		

Información General:

Herbicida para el control pre emergente de malezas en el cultivo de remolacha, acelga y espinaca.
Es absorbido principalmente por la raíz y también por la hoja, obteniendo su mayor acción cuando las malezas comienzan a germinar.
Su efecto residual se prolonga por más de 60 días; a pesar de esto no se acumula en el suelo y pasados 3 meses de su aplicación su efecto desaparece.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Aplicar con cualquier equipo de arrastre o mochila con presiones entre 30 - 50 lb\pulg2 y con un caudal mínimo de 400 l/ha. Realizar los tratamientos con buena humedad del suelo; si no se produjeran lluvias dentro de los 7 días posteriores a la aplicación, se deberá regar por aspersión o manto el equivalente a una lluvia de 20 a 30 mm.

En acelga con alta infestación de capiquí aplicar las mayores dosis.
En caso de tratamiento en bandas puede reducirse la cantidad de agua en proporción a la superficie a tratar.
Se recomienda no aplicar en el momento en que las plantas estén naciendo y con los cotiledones en posición vertical, porque puede causar una detención temporaria del crecimiento. Cuando la temperatura es superior a 25°C procure no aplicar así como también cuando sea menor a 10°C.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas usados habitualmente.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HRAC) ó 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales: Ligeramente tóxico para peces y prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

DL 50 oral aguda del P.A.: 3.600 mg/kg (rata).

Aplicar tratamiento sintomático.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.