CLORIMURON ETIL

Marcas comerciales: CLASSIC – CLORIMURON 75 MAX SIGMA.

Nomenclatura Química:
clorimurón etil: etil 2-[((((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino)carbonil)amino)sulfonil] benzoato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Pasturas	Falsa biznaga (*Ammi majus)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Myagrum rugosum)* Nabillo (*Sisymbrium irio)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)*	PC 25%: 20 - 30 g/ha PC 75% 7-10 g/ha	30	Aplicar en post emergencia de las malezas y de la pastura. Aplicar desde que la maleza tiene 3 hojas trifoliadas y las gramíneas 3 hojas verdaderas. La máxima eficacia se logra aplicando cuando las malezas son pequeñas y están en activo crecimiento. Agregar tensioactivo no iónico, a razón de 200 cm3 cada 100 litros de agua. En algunas ocasiones, luego de la aplicación puede observarse una detención temporaria del crecimiento, que no afectará a la producción de la pastura. Este período varía entre 15 y 45 días, según las condiciones climáticas. Recomendado para pasturas consociadas perennes de alfalfa, cebadilla, falaris, festuca, pasto ovillo, raigrás y trébol blanco.
Soja	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Nabo (*Brassica campestris)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	PC 25%: 40 - 60 g/ha PC 75% 13-20 g/ha	60	Aplicar en post emergencia de las malezas y de la soja. Para lograr la máxima eficacia se debe efectuar el tratamiento cuando las malezas se encuentran en activo crecimiento (2 a 5 hojas). Agregar tensioactivo no iónico a razón de 200 cm3 cada 100 litros de agua. A la dosis más alta es posible que se produzca clorosis o retardo temporario del crecimiento, que no afectará el rendimiento de la soja.
	Bejuco (*) (*Ipomoea spp.)*	PC 25%: 40 - 60 g/ha + 50 cm3/ha de 2,4-DB 100% PC 75% 13-20 g/ha + 50cm3/ha de 2,4 D B 100%		
	Malva cimarrona (*) (*Anoda cristata)*	PC 25%: 40 - 60 g/ha + 18 g/ha de flumetsulam 80% WG PC 75% 13 á 20 g/ha + 18g/ha de flumesulam 80 WG		

(*) BACKUP no está recomendado para el control de las malezas marcadas con asterisco.

Información General:

Modo de acción: clorimuron etil es un herbicida post emergente para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de soja.
El producto aplicado es rápidamente absorbido por raíces y follaje, translocándose por toda la planta.
Las malezas susceptibles cesan su crecimiento casi inmediatamente después de realizado el tratamiento. Las hojas se vuelven cloróticas en 3 a 5 días, y se produce necrosis en los puntos de crecimiento.
La muerte ocurre 7 a 21 días después de la aplicación.

Preparación: Para preparar el producto se aconseja seguir los siguientes pasos:
- Cargar con agua el tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su capacidad.
- Con agitación agregar la cantidad requerida.
- Agregar la cantidad necesaria de surfactante no iónico.
- Completar las cargas de agua en el tanque.
- Agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión homogénea.

Equipos y técnica de aplicación: clorimuron etil puede ser aplicado con avión y con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados.
Es imprescindible agregar un tensioactivo no iónico a razón de 200 cm3 cada 100 litros de agua.
En el caso de aplicar con avión, se recomienda un caudal de 15 a 25 l/ha.
Para aplicación con equipos terrestres se puede trabajar con un caudal de 100 a 130 l/ha de agua. La presión de trabajo debe ser de 80 a 100 libras/pulg2 (5,5 a 7 bar). Para conseguir una buena cobertura, se recomienda usar pastillas de abanico plano.
Aplicación aérea: Usar boquillas que provean una óptima distribución de las gotas y máxima cobertura con un caudal de 30-40 litros de agua por hectárea.
Usar como mínimo 30 litros de agua por hectárea. Con alta densidad de malezas o follaje denso aumentar el volumen.

Restricciones de uso:
NO aplicar donde haya suelos de pH 6,8 a 7,0 ó mayores, ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
NO aplicar a plantas bajo estrés debido a falta de precipitaciones, ya que en estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida.
NO aplicar si se espera que llueva dentro de 4 horas de realizada la aplicación, ya que el control puede no ser satisfactorio.
NO aplicar en lotes donde dentro de los 9 meses siguientes el tratamiento se prevea la siembra de sorgo, girasol, arroz o maní, ya que podrán ser dañados por residuos remanentes del producto.
NO aplicar con inversión térmica, con vientos fuertes o arranchados, u otras condiciones que puedan perjudicar la cobertura o alcanzar cultivos no deseados.
NO se debe escardillar el cultivo hasta 5 días después de realizada la aplicación.
Periodo de carencia en soja 60 días. En caso de las pasturas dejar transcurrir entre el pastoreo o cosecha de las mismas al menos 30 días.
Reingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado completamente de la superficie de las hojas.

Limpieza de la pulverizadora: muy importante, dada la gran actividad y especificidad del clorimuron etil, aún en concentraciones muy bajas, luego de utilizar la pulverizadora con este producto y antes de tratar otros cultivos distintos de soja, los cuales podrían resultar afectados, es necesario eliminar cuidadosamente todos los residuos que pudieran haber quedado en la misma.
Las pulverizadoras terrestres se lavarán con agua lavandina, mientras que para los aviones se empleará agua amoniacal. Los pasos detallados de la operación de limpieza se describen en el marbete del producto comercial.

Compatibilidad: NO mezclar clorimuron etil con otros herbicidas o productos que no estén expresamente indicados por la empresa responsable, ya que puede haber reducción de actividad del herbicida o daño al cultivo.

Derrames:
Producto sin preparar: recoger con pala el producto y colocarlo en un recipiente rotulado, cubrir con solución de lavandina (0.5 litros cada 100 litros de agua); dejar 30 días.
Producto preparado: crear una barrera de contención para el derrame con tierra, arena o vermiculita. Evitar que el material tome contacto con cloacas, cursos de agua o áreas bajas. Cubrir el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanía de plantas o árboles, remover 5 cm de tierra superficial después de la limpieza inicial.
Colocar los desechos en bolsas contenedoras rotuladas, y en el caso de que no haya centro de acopio próximo se procederá a eliminarlas mediante incineración controlada en sitios especializados para tal fin.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo y aplicación: protector facial, guantes de goma, calzado con medias, camisa de mangas largas, pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria (i.a.rata)	CL50: > 5 mg/l.

Irritación dermal (conejo):	Moderado irritante. No irritante para CLORIMURON 75 MAX SIGMA:
Irritación ocular (conejo):	Leve irritante.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Tratamiento: no existe antídoto específico; aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico / Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CLASSIC	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	35962	WG	25%	IV
CLORIMURON 75 MAX SIGMA	SIGMA AGRO SA	38863	WG	75%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.