Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

COMPUESTO FERRICO



Nomenclatura Química:
Compuesto Férrico.
Clasificación Química: compuesto quelatado.
Acción: aporte de hierro.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ciruelo Cítricos o citrus Duraznero	10 - 100 g/planta	Se puede aplicar desde plantación joven (menores dosis) hasta inicio y plena producción (dosis mayores).
Florales Hortalizas	0,5 - 3 g/planta	Aplicar solo en plantación joven.
Manzano Peral	15 - 80 g/planta	Se puede aplicar desde plantación joven (menores dosis) hasta inicio y plena producción (dosis mayores).
Uva de mesa	5 - 20 g/planta	
Vid	3 - 10 g/planta	

Información General:

La carencia de Hierro no suele deberse a la falta total de este elemento en el suelo. Tampoco significa, que haya necesariamente, una disponibilidad de Hierro insuficiente, puesto que puede estar en forma no asimilable, total o parcialmente. En realidad, puede existir una carencia de Hierro y presentar un contenido adecuado de este elemento disponible en el suelo, por diferentes motivos:
- Incapacidad de las raíces para tomar Hierro del suelo. Esto ocurre en variedades o patrones sensibles o no eficaces.
- Existencia de interferencias que impidan la translocación del Hierro de las raíces a las hojas.
- Que haya sido afectada la solubilidad de este elemento en el sistema radicular.

La más conocida y de mayor interés es la primera, aunque en las tres participa negativamente el ión bicarbonato. Los abonos de hierro son, por lo general, solubles en agua, ya que el problema de hierro no es su abundancia, sino su inmovilidad.

Reacción en el suelo, índice 7 - 8.

Se trata de un fertilizante en forma de microgranulado, a base de Hierro (Fe) Quelatado (EDDHA), de alta solubilidad que permite corregir, en aplicaciones al suelo, deficiencias de Hierro (Fe) presentando gran estabilidad en una amplia gama de pH de suelo.
Mientras que en cualquier otro tipo de fertilizante el principio activo es el propio elemento que van a aportar, en los quelatos férricos esto no es así el agente quelante que lo acompaña es el responsable principal de su acción.

Los quelatos deben:
- Incrementar la solubilización de hierro.
- Transportarlo hacia la raíz de la planta.
- En la raíz de la planta deben ceder el Hierro (Fe).
- La parte orgánica del quelato debe volver a solubilizar más hierro.

Es aquí donde el quelato actúa de modo bien diferente al resto de los fertilizantes ya que no sólo aportará el hierro que con el se aplica al cultivo, sino que puede aumentar el aprovechamiento del hierro nativo del suelo.

Aplicación:
- En caso de problemas graves de clorosis: aplicar 2/3 partes de las dosis indicadas al inicio de desarrollo y la segunda aplicación hacia finales de la temporada.
- Aplicar las dosis altas cuando la sensibilidad de portainjertos a clorosis sea alta, a mayor pH de suelo o con altos contenidos de carbonatos en suelo.
- Aplicar en forma manual sobre el suelo alrededor de las plantas consideradas.
- Puede ser aplicado también con el agua de riego. En estos casos la concentración máxima recomendada en agua de riego es 2%.

Derrames:

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Absorber el derrame con material adecuado (arena, aserrín) y colocarlo en un recipiente adecuado para su disposición final recurrir a empresas especializadas habilitadas localmente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.