DICAMBA + PROSULFURON + TRIASULFURON

Marcas comerciales: PEAK PACK - PEAK PACK L - SERIENT PACK.

Nomenclatura Química:
prosulfurón: N-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)-amino]carbonil]-2-(3,3,3-trifluoropropil)-benceno sulfonamida (CA)
triasulfurón : 3-(6-metoxi-4-metil-1,3,5-triazina-2-il)-1-[2-(2-cloroetoxi)-fenilsulfonil]-urea
dicamba:(sal dimetilamina del ácido 2-metoxi 3,6 diclorobenzoico)/ sal sódica 2-metoxi 3,6 didiclorobenzoico
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea + sulfonilurea + ácido benzoico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*	Pack 57,71 SL + 75 WG + 75 WG: 10 g/ha Parte sólida 1 (prosulfuron) + 10 g/ha Parte sólida 2 (triasulfuron) + 150 cm3/ha Parte líquida 3 (dicamba).	(***)	Cultivo: post-emergencia temprana (desde las 2 hojas hasta fin de macollaje). Malezas de hoja ancha: entre 2 y 4 hojas. Aplicar con humectante no iónico coadyuvante alcohol graso etoxilado 48% en proporción de 0.025 % (25 cm3/100 litros de caldo).
Trigo	Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Calabacilla (*Silene gallica)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cardo pendiente (*Carduus thoermeri)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Flor de pajarito (*Fumaria agraria)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* No me olvides (*Anagallis arvensis)* Ortiga mansa (*) (*Lamium amplexicaule)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Senecio amarillo (*Senecio madagascariensis)* Verónica (*Veronica arvensis)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)*	Pack 57,71 SL + 75 WG + 75 WG: 10 g/ha Parte sólida 1 (prosulfuron) + 10 g/ha Parte sólida 2 (triasulfuron) + 150 cm3/ha Parte líquida 3 (dicamba). Pack 87,5 WG + 75 WG + 75 WG: 10 g/ha Parte sólida 1 (prosulfuron) + 10 g/ha Parte sólida 2 (triasulfuron) + 100 cm3/ha Parte sólida 3 (dicamba). (**)		

(*) Para un buen control de Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), el momento de aplicación indicado es desde pre-emergencia de la maleza hasta primer par de hojas. Con malezas de mayor tamaño, el control es poco satisfactorio.
(**) Aplicar con humectante no iónico coadyuvante alcohol graso etoxilado 48 % en proporción de 0.025 % v/v (25 cm3/100 litros de caldo).
(***) No se establece periodo de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Herbicida post-emergente de acción sistémica, selectivo para los cultivos de trigo y cebada. Ejerce control sobre malezas de hoja ancha. Es absorbido a través de las hojas y las raíces y traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas. Pocos días después de la aplicación, las plantas presentan deformaciones, epinastia, y coloración amarillenta sobre todo en las hojas superiores, que luego tornan a violáceo. Estos síntomas se acentúan hasta el marchitamiento, necrosis y muerte de la planta.
Para lograr un buen resultado en el control de malezas, es importante que las mismas se encuentren en activo crecimiento, con un tamaño adecuado, y en buenas condiciones tanto de humedad de suelo, como de temperatura ambiente.
Este producto debe ser aplicado en post-emergencia temprana de las malezas, cuando éstas son pequeñas, se encuentren en activo crecimiento y con buenas condiciones de humedad del suelo. No es recomendable realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo stress hídrico, haya vientos superiores a 10 km por hora y/o rocío sobre el follaje. Puede ser usado en los cultivos de trigo y cebada, tanto en siembra convencional como en siembra directa.

Preparación:
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar directamente en el tanque la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración previa realizada, siguiendo la secuencia de acuerdo al número de los productos: Parte 1 (prosulfuron), Parte 2 (triasulfuron) y Parte 3 (dicamba), sin detener la agitación. Corroborar que los productos se mezclen adecuadamente. Una vez que el producto está bien disuelto y en suspensión, agregar el coadyuvante alcohol etoxilado al 48% a razón de 0,025%v/v (25 cm3/100 litros de caldo). Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30-40 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. En aplicaciones terrestres se recomienda emplear un volumen de agua de 80-100 l/ha, presión de 30-40 lb/pulg2 y pastillas de abanico plano (8001; 8002; 11001; 11002). Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora. En aplicaciones aéreas utilizar un volumen de agua de 15-20 l/ha. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia, se recomienda aplicarlo acompañado de humectante no iónico (coadyuvante alcohol graso etoxilado 48 % en proporción de 0.025 % v/v (25 cm3/100 litros de caldo).

Restricciones de uso: este producto permite la rotación de cualquier cultivo posterior a trigo, siguiendo las prácticas agrícolas normales, sin que sufra daños o estrés por efecto de residualidad del herbicida.
Deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones: no se recomienda el uso en lotes que luego serán destinados a girasol de segunda. No se aconseja la aplicación de en lotes con pH mayor a 6.5, con contenido de arena mayor a 50%, y/o contenido de materia orgánica menor a 2%, que luego serán destinados a soja de segunda. Sembrar soja de segunda solo cuando hayan transcurrido 100 días desde la aplicación y hayan llovido más de 150 mm. No aplicar en trigo si en el barbecho, antes de la siembra, se utilizó metsulfurón, triasulfurón o prosulfurón.
Para el Pack 87,5 WG + 75 WG + 75 WG no se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida.
Para el Pack 57,71 SL + 75 WG + 75 WG se deberán dejar transcurrir los siguientes días entre la aplicación y la cosecha, trigo: 60 días; cebada: 30 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Prevención y manejo de resistencias
El Prosulfuron y Triasulfuron pertenecen al grupo B y el Dicamba pertenece al grupo O de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: no realizar mezclas de tanque con insecticidas organofosforados. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo y cebada, respetando las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Líquido y caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC) + 2 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.

Información Toxicológica:

PF prosulfuron 75% WG:
DL50 oral aguda: 2000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)

PF triasulfuron 75% WG:
DL50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)

PF dicamba 57,71% SL:
DL50 oral aguda: 3541 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata)

PF dicamba 87,5% WG:
DL50 oral aguda: 2062 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)

Pack 75% WG + 75% WG + 57,71% SL:
PRODUCTO POCO PELIGROSO. CLASE III.
No irritante dermal ni ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Pack 75% WG + 75% WG + 87,5% WG:
PRODUCTO POCO PELIGROSO. CLASE III.
No irritante dermal ni ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Pack 57,71% SL + 75% WG + 75% WG : Prácticamente no tóxico para peces.
Pack 87,5% WG + 75% WG + 75% WG: Prácticamente no tóxico para peces.

Pack 57,71% SL + 75% WG + 75% WG: Prácticamente no tóxico para aves.
Pack 87,5% WG + 75% WG + 75% WG: Moderadamente tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación y evitar que tomen contacto con el producto. No contaminar las posibles fuentes de agua de aves u otros animales.

Pack 57,71% SL + 75% WG + 75% WG: Virtualmente no tóxico para las abejas.
Pack 87,5% WG + 75% WG + 75% WG: Virtualmente no tóxico para las abejas.

No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto. Dejar una zona o franja de seguridad de 50 metros, entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PEAK PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-091	WG + WG + WG	87,5% + 75% + 75%	III
PEAK PACK L	SYNGENTA AGRO	PACK-087	SL + WG + WG	57,71% + 75% + 75%	III
SERIENT PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-215	WG + WG + WG	87,5% + 75% + 75%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.