DICLOSULAM

Marcas comerciales: BIGUÁ - HEXEN - INTRUDER FUSION - KONYZ – RIDOF - RIDOF WG – SPIDER - STRONGARM.

Nomenclatura Química:
diclosulam: N-(2,6-diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro-1,2,4-triazolo[1,5 c] pirimidina-2-sulfonamida.
Clasificación Química: triazolpirimidina.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Abrojos (*Xanthium spp.)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyos colorados (*Amaranthus spp.)*	24 g/ha + 0,75 l/ha de acetoclor. (90%)		Pre-emergencia: aplicar inmediatamente después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo, sobre suelo preparado y libre de malezas. Las lluvias posteriores a la aplicación incorporarán el producto y éste controlará a las malezas antes de la emergencia. Observaciones: los suelos sueltos de la zona manicera permiten el control de malezas con dosis menores que en suelos pesados.
	Campanilla (*Ipomoea purpurea)*	15 g/ha + 0,2% v/v coadyuvante. (*)		Aplicar en post-emergencia, con malezas de 2 a 4 hojas y en activo crecimiento.
Soja	Bejuco (*Ipomoea nil)* Campanilla (*Ipomoea purpurea)*	42 g/ha (NOA y NEA)		Dosis recomendada solamente para soja no transgénica. En caso de soja resistente a glifosato, aplicar 30 g de diclosulam 84% + glifosato (60,8%) a las dosis recomendadas en la etiqueta.
	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyos colorados (*Amaranthus spp.)*	30 g/ha (Pampa húmeda, NOA y NEA)		Pre-siembra o pre-emergencia: - en labranzas convencionales aplicar diclosulam 84% sólo, a la dosis recomendada - en siembra directa, es posible aplicar diclosulam 84% + glifosato (60,8%) como tratamiento de quemado desde 20 días antes, hasta la siembra. Para suelos sueltos (por ej. suelos de la Prov. de Córdoba) con menos del 2% de materia orgánica, aplicar diclosulam 84% a una dosis de 24 g/ha, ya que en los mismos el herbicida se encuentra más disponible que en suelos más pesados. Para aumentar el espectro de control de las malezas latifoliadas mencionadas en los cuadros anteriores a gramíneas anuales, agregar acetoclor (90%) a una dosis de 0,8 - 1 l/ha a las dosis de diclosulam recomendadas. Esto permitirá ampliar el control a capín arroz (Echinochloa crus-galli), colas de zorro (Setaria spp.), pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis) y pie de gallina (Eleusine indica).
Soja RG/RR (Resistente a glifosato)	Bejucos (*Ipomoea spp.)*	16 g/ha + glifosato (60,8 %). (**)		Zona NOA - Aplicar en post-emergencia con malezas de 2 a 4 hojas y en activo crecimiento.
		9,5 a 12 g/ha + glifosato (60,8 %). (**)		Zona Córdoba - Aplicar la dosis mínima, en post-emergencia en suelos con materia orgánica menor a 2%. En suelos con materia orgánica mayor a 2%, aplicar la dosis máxima.

(*) Coadyuvante tensioactivo no iónico.
(**) A las dosis recomendadas en la etiqueta.

Información General:

Es un herbicida selectivo para el control de las malezas de hoja ancha indicadas en el cuadro, que compiten con los cultivos de soja y maní. Es activo en tratamientos de suelo (pre-siembra y preemergencia) y post- emergencia. Los controles más eficientes se logran cuando se producen lluvias después de la aplicación, independientemente de la humedad del suelo.

Preparación: colocar agua en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad, haciendo funcionar el retorno. Agregar la cantidad de bolsas solubles del herbicida diclosulam 84% de acuerdo a la superficie a tratar. Agregar ésteres metílicos de

ácidos grasos de aceite vegetal 76,6% en el caldo a razón de 0,5% v/v (0,5 l de aceite/ 100 litros de caldo).Si se usa sólo, completar el llenado del tanque con agua. Si se usa en mezclas con otros herbicidas, llenar el tanque hasta 3/4 partes de su capacidad y agregar al mismo glifosato (60,8 %) o acetoclor (90 %). Luego completar el llenado del tanque con agua.
En todos los casos es muy importante mantener el sistema de retorno en funcionamiento durante la preparación del caldo y la aplicación, para una correcta dispersión y dilución de los productos.
Equipos de aplicación: máquinas terrestres provistas de barra o botalón. Pastillas tipo abanico plano (8003, 8004, 11003, 11004). Presión: 30 a 60 lb/pulg2. Caudal: 150 - 200 l/ha.

Técnica de aplicación:
Pre-siembra: en esquemas de siembra directa, se recomienda la aplicación conjunta de diclosulam y glifosato, cuando la cobertura verde no sea excesiva. En el caso de que se encuentren coberturas verdes que impidan ver el suelo, se recomienda efectuar primero el quemado con glifosato y posteriormente la aplicación de diclosulam.
Pre-siembra y pre-emergencia: en esquemas de labranza convencional; aplicar sobre el suelo libre de malezas y preparado para la siembra. No debe haber terrones grandes que impidan una distribución uniforme del producto sobre la superficie del suelo.
Post-emergencia: aplicar con malezas de 2-4 hojas en activo crecimiento.

Restricciones de uso:
Soja: uso posicionado. Aplicación en suelo. Pre-siembra y pre-emergencia del cultivo. Aplicación en post-emergencia en mezcla con glifosato (60,8 %) para control de ipomea (Ipomoea spp.) en soja resistente, en NOA y Córdoba.
- Pampa húmeda: se recomienda rotar los lotes que han sido tratados con diclosulam 84%, únicamente a los cultivos de soja, trigo, maíz y maní.
- Norte argentino (NOA y NEA): se recomienda rotar los lotes de soja que han sido tratados con diclosulam 84%, únicamente a los cultivos de soja, poroto y trigo, en la siguiente campaña.
Maní: uso posicionado. Aplicación en suelo: pre-emergencia del cultivo. Aplicación en post-emergencia con el agregado de coadyuvante, para control de campanilla (Ipomoea purpurea). Se recomienda rotar los lotes que han sido tratados con diclosulam 84% a cultivos de soja, trigo, maíz y maní.

Compatibilidad:
Es compatible con los herbicidas recomendados para la mezcla de tanque.

Derrames:
En cualquier caso crear una barrera de contención para el derrame; evitar que el material tome contacto con desagües, cloacas, cuerpos o cursos de agua.
Producto sin preparar:
Barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua. Enviar para su incineración a instalaciones autorizadas, o disponer en sitios autorizados.
Caldo de pulverización:
Cubrir el producto con un material adsorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanías de plantas o árboles, después de la limpieza inicial, remover 5 cm de tierra superficial.
En todos los casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Barbijo.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 2000 mg/kg.

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 2000 mg/kg.

Irritacion dermal:	No irritante dermal
Sensibilización de la piel:	No sensibilizante dermal
Irritacion ocular:	Moderado irritante ocular / Severo irritante ocular (*)

(*) Producto formulado Ridof

Antídoto: no posee. En caso de ingestión no provocar el vómito. El lavaje gástrico debe ser supervisado por personal entrenado. Consultar a un médico.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico para abejas.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico para aves.
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico para peces y para organismos acuáticos.

Riesgos ambientales: (*)
Toxicidad para abejas: Producto virtualmente no toxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no toxico
Toxicidad para peces: Ligeramente toxico.
(*) Recomendación de Atanor S.C.A

Extremadamente tóxico para algas. No contaminar fuentes naturales de agua. Se recomienda aplicar a más de 5 m de cuerpos o cursos de agua para evitar la pulverización directa o deriva sobre los mismos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BIGUÁ	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37301	WG	84%	III
HEXEN	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37383	WG	84%	III
INTRUDER FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39771	WG	84%	III
KONYZ	NUFARM S.A.	39057	WG	84%	III
RIDOF	ATANOR S.C.A	39743	WG	84%	IV
RIDOF WG	ATANOR S.C.A	39051	WG	84%	III
SPIDER	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	33101	WG	84%	III
STRONGARM	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41404	WG	84%	III