Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

DICOFOL + TETRADIFON

Nomenclatura Química:
dicofol:1,1-bis (p-clorofenil) 2,2,2-tricloroetanol ó 2,2,2-tricloro - 1,1-bis (4-clorofenil) etanol tetradifón: 2,4,5,4 tetracloro difenil sulfona ó 4-clorofenil 2,4,5-triclorofenil sulfona.
Clasificación Química: organoclorado + clorofenil sulfonilbenceno.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa Trébol blanco	Arañuela de la alfalfa (*Tetranychus desertorum)*	200 cm3/hl o 1 - 2 l/ha	40	En caso de existir telarañas, pasar una rastra de ramas para destruirlas y luego pulverizar.
Florales Ornamentales	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)*	200 cm3/hl		Aplicar cuando aparezcan los ácaros. Repetir en caso necesario.
Limón Naranjo Pomelo	Acaro de la lepra explosiva (*Brevipalpus obovatus)* Acaro del plateado (*Eutetranychus banksi)* Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)*		15	Aplicar cuando se noten los primeros ácaros. Repetir en caso necesario.
Manzano Peral	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*			Aplicar cuando los botones florales empiecen a tomar color, si no se ha realizado tratamiento de invierno. Pulverizar si se ven de 3 a 5 ácaros por hoja. Repetir en caso necesario.
Vid	Arañuela chata (*Brevipalpus phoenicis)*	200 cm3/hl o 1 - 2 l/ha		Aplicar cuando se note el ataque de ácaros, especialmente durante la formación de los racimos.

Información General:

Su acción de contacto e ingestión se manifiesta sobre ácaros y arañuelas en todos sus estadios de desarrollo: huevos, larvas, ninfas y adultos.

Equipos de aplicación: puede aplicarse con máquinas pulverizadoras de alto y bajo volumen, accionadas a mano o con motor. Las dosis indicadas en la tabla de uso son para equipos de alto volumen. Si se usaran equipos de bajo volumen, la concentración se elevará tantas veces como se disminuya el volumen de agua aplicado por hectárea o por planta. Cubrir bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo pero sin empapar las hojas.

Compatibilidad: es compatible con casi todos los plaguicidas de uso común. No compatible con mezclas alcalinas (polvo y/o caldo Bordelés o polisulfuro de calcio).

Inactivación y tratamiento de residuos: mojar con soda cáustica al 10% (1 kg en 10 litros de agua).
Derrames: cubrir con tierra o arena. Recoger en bolsas e incinerar en instalaciones apropiadas.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): un (IRAC) + 12 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

DL 50 del principio activo expresada en mg/kg de peso corpóreo:
Dicofol: Oral aguda: 684 - 800 mg/kg (rata).
Dermal aguda: 2100 mg/kg.
Tetradifón: Oral aguda: 14700 mg/kg.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para aves. Muy tóxico para peces.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.