DIFENOCONAZOLE + CYPROCONAZOLE

Marcas comerciales: CYPRESS - ZARDEX.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4 triazol
cyproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(IH-1,2,4-triazol-1-il)-butano-2-ol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	PC 25% + 15%: 300 cm3/ha	30	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas. Repetir a los 21 días.
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón de la vaina y del tallo (*Phomopsis spp.)*	PC 25% + 15%: 200 - 300 cm3/ha.	35	PC 25% + 15%: aplicar cuando se observen los primeros síntomas en la planta, a partir de floración (R1-R2) hasta el llenado de granos (R5 - R6). La aplicación debe realizarse a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			PC 25% + 15%: aplicar a la aparición de las primeras pústulas (1 - 3% de infección), en el tercio inferior de la planta, a partir de la floración del cultivo (R1). Repetir en caso de infección. La aplicación debe realizarse a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

Información General:

Fungicida sistémico para el control de roya y de enfermedades de fin de ciclo en el cultivo de soja y para el control de viruelas en el cultivo de maní.
Está formulado con una mezcla de triazoles, que inhiben el desarrollo de los hongos, aunque estos no presenten síntomas. Cyproconazole penetra muy rápidamente en la planta, absorbiéndose en menos de una hora, quedando la planta debidamente protegida. Una vez en el interior, se trasloca dentro de la planta distribuyéndose en forma homogénea. Por otra parte, difenoconazole inhibe en forma significativa el desarrollo subcuticular del micelio del hongo y previene el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Tiene propiedades sistémicas locales y gran capacidad traslaminar. Estas características del producto confieren protección preventiva y curativa contra enfermedades de fin de ciclo y roya de la soja, y contra viruelas en el cultivo de maní.

Preparación: para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
Es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa. Corroborar que el producto se disuelva correctamente.
-Completar con agua el tanque, hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la emulsión.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado en el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 l/ha y una presión superior a 4,8 bar (70 lb/pulg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 l/ha.
NO deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con

altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Aplicar lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: se deben dejar transcurrir 35 días entre la última aplicación y la cosecha de soja y 30 días para maní. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Prevención y Manejo de la Resistencia
El producto formulado pertenece al grupo 3 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo..

Compatibilidad: puede mezclarse en tanque con la mayoría de los productos agroquímicos, no recomendándose hacerlo con productos a base de cobre. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Uso: curasemillas fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago tritici)* Golpe blanco del trigo (*Fusarium graminearum)*	100 cm3/100 kg de semilla.	(*)	Tratamiento de semilla.

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas.

Información General:

Fungicida sistémico, que siendo aplicado a las semillas de trigo, controla enfermedades de las semillas y del suelo. Posee acción sistémica, siendo absorbido por la semilla y traslocado a través de la plántula. Está especialmente recomendado para el control del carbón volador (Ustilago tritici), caries o carbón hediondo (Tilletia caries) y golpe blanco del trigo (Fusarium graminearum). No afecta el poder germinativo de las semillas de trigo y les permite desarrollarse normalmente.

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando a la dosis indicada del producto agua limpia, en cantidad necesaria hasta llegar a un volumen de 1 litro de caldo cada 100 kg de semilla.

CULTIVO: TRIGO
PC 3%+0,6% + AGUA: 100 cm3 + 900 cm3
VOLUMEN DE DILUCIÓN: 1000 cm3/100 kg de semilla

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
-Agregar luego la cantidad necesaria de producto, según la cantidad de semillas a tratar.
-Agitar en forma mecánica o manual.
-Verificar que el producto se disuelva correctamente.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto viene formulado como suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de trigo en forma de dilución. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme. El tratamiento se debe realizar utilizando máquinas especiales para tratamiento de semillas, como Gustafson, Miretti o similares. Cuando no se dispone de maquinaria o la cantidad a tratar es limitada, se puede usar un tambor giratorio o máquina tipo "hormigonera".
NO aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

NO se debe exceder la cantidad de 1.000 cm3 por cada 100 kg de semilla, ya que la humedad influye desfavorablemente en la germinación, al estar la semilla almacenada durante tiempo. En caso de almacenar la semilla tratada, hacerlo cuando la misma esté bien seca.

Período de carencia: exento para el uso como curasemillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: puede mezclarse con otros terápicos para tratamientos de semillas, formulados como polvos o suspensiones concentradas. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 25% + 15%:
DL50 oral aguda: 3129 mg/kg peso corporal (ratas)
DL50: >5050 mg/kg peso corporal (conejos)

Ligeramente peligroso. Clase III.
Severo irritante ocular. No irritante dermal. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Del producto formulado 3% + 0,6%:
LD50: >3000 mg/kg peso corporal (ratas)
LD50: >4000 mg/kg peso corporal (ratas)
LC50: >5527 mg/m3 de aire (ratas)

Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV.
No irritante ocular ni dermal. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales del formulado 25%+15%:
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para aves y ligeramente tóxico para abejas.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días, o entornar las piqueras durante la aplicación. Tomar la precaución de no contaminar fuentes de bebida con los remanentes del producto. No contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Riesgos ambientales del formulado 3% + 0,6%:

Ligeramente tóxico para peces.
Evitar la contaminación de aguas destinadas al riego o a usos domésticos. No desechar el producto en depósitos de agua, tales como lagos, diques, lagunas, sistemas de drenaje, etc. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para las abejas.
No es recomendable tratar con este producto más semillas de las que van a usarse en la campaña. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada con el producto, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. No contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CYPRESS	SYNGENTA AGRO	35421	EC	25% + 15%	III
ZARDEX	SYNGENTA AGRO	33545	FS	3% + 0,6%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.