DIFENOCONAZOLE + PROPICONAZOLE

Marcas comerciales: GEM - TASPA.

Nomenclatura Química:
propiconazole: 1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil]1H-1,2,4 triazole
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazole
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	200 - 250 cm3/ha	30	Aplicar con humectante no iónico con una concentración de 0,2% (200 cm3/100 l de agua) a la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 a 21 días. Aplicar las dosis mayores cuando existan condiciones ambientales que permitan esperar una gran presión de la enfermedad. La dosis más alta y el intervalo de aplicación más reducido deberán respetarse cuando existan condiciones ambientales altamente predisponentes para el desarrollo de la enfermedad.
Papa	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*			Aplicar con humectante no iónico con una concentración de 0,2% (200 cm3/100 l de agua) a la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 días. Aplicar las dosis mayores cuando existan condiciones ambientales que permitan esperar una gran presión de la enfermedad. TASPA ® no controla tizón tardío (Phytopthora infestans). Cuando exista el riesgo de ataque simultáneo de tizón tardío (Phytophtora infestans), se recomienda el uso en mezcla de tanque con productos que controlen esta enfermedad.
Soja	Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*	150 cm3/ha	35	Aplicar con humectante no iónico con una concentración de 0,2% (200 cm3/100 l de agua). Realizar una primera aplicación con el cultivo en R3 (comienzo de fructificación), repitiendo si es necesario en R5 - R6 (llenado de granos - máximo tamaño de semilla).
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar al observar los primeros síntomas. Realizar una segunda aplicación a los 14 días en caso que la presión de la roya continúe. Aplicar con humectante no iónico con una concentración de 0,2% (200 cm3/100 l de agua).

Información General:

Fungicida que combina la acción sistémica de dos compuestos del grupo de los triazoles, el propiconazole y el difenoconazole. Los atributos de dichos activos proveen acción preventiva duradera y curativa contra una amplio rango de enfermedades presentes en los cultivos de papa, maní y soja.

Preparación:
Es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque. Corroborar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Aplicaciones terrestres: aplicar el producto con un volumen mínimo de agua de 200 l/ha, presión de 4-6 bar (60-80 lb/pulg2) y picos de cono hueco preferiblemente. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora.
Aplicaciones aéreas: utilizar un volumen mínimo de agua de 20 l/ha. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h y humedad relativa menor al 60%.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.

Aditivos: debe ser aplicado con humectante no iónico con una concentración de 0,2 % v/v (200 cm3/100 litros de agua).

Restricciones de uso:
Periodos de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 30 días en los cultivos de papa y maní y 35 días en el cultivo de soja. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.
Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de distinto modo de acción.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. Es compatible con metalaxil-M 35%. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Prevención y Manejo de la Resistencia
TASPA ® pertenece al grupo 3 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata)

Irritante dermal y ocular. Posible sensibilizante dermal.
Solvente: xileno.
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación.
Síntomas de intoxicación aguda: en caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y diarreas.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para las abejas.
No contaminar las posibles fuentes de agua de aves u otros animales. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GEM	SYNGENTA AGRO	34345	EC	25% y 25%	III
TASPA	SYNGENTA AGRO	33172	EC	25% y 25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.