Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

DIMETENAMIDA

Nomenclatura Química:
2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N(2-metoxi-1-metiletil)-acetamida.
Clasificación Química: cloroacetamida.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (preemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Afata (*Sida rhombifolia)* Amor seco (*Bidens subalternans)* Cafecillo (*Cassia tora)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cardillo (*Cenchrus ciliaris)* Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo torito (*Acanthospermum hispidum)*	Según suelos.	30	Para Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, NE de La Pampa: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Dosis: Suelos livianos: 1000 + 1300 de diuron 80% o + 2000 de prometrina 50%. Suelos medianos: 1250 + 1300 de diuron 80% o + 2000 de prometria 50%. Para SE de Buenos Aires: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos livianos y medianos: 1000 + 1400 de flurometuron 50%.
	Bejucos (*Ipomoea spp.)*			Para SE de Buenos Aires: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos livianos y medianos: 1000 + 1400 de flurometuron 50%.
Girasol	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Para Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, NE de La Pampa: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Dosis: Suelos livianos: 1000 + 1000 de fluorocloridona 25% o + 1500 de prometrina 50% o + 180 de diflufenican 50%. Suelos medianos: 1250 + 1000 fluorocloridona 25% o + 1500 de prometria 50% o + 200 de diflufenican 50%. Para SE de Buenos Aires: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos medianos: 1250 + 1000 de fluorocloridona 25% + 200 de diflufenican 50%. Suelos pesados: 1500 + 1250 fluorocloridona 25% + 250 de diflufenican 50%.
	Cardo ruso (*Salsola kali)* Morenita (*Kochia scoparia)*			Para Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, NE de La Pampa: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Dosis: Suelos livianos: 1000 + 1000 de fluorocloridona 25% o + 1500 de prometrina 50% o + 180 de diflufenican 50%. Suelos medianos: 1250 + 1000 fluorocloridona 25% o + 1500 de prometria 50% o + 200 de diflufenican 50%.
	Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Mostacilla (*Myagrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)*			Para SE de Buenos Aires: En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Dosis: Suelos medianos: 1250 + 1000 de flurocloridona 25% + 200 de diflufenican 50%. Suelos pesados: 1500 + 1250 de fluorocloridona 25% + 250 de diflufenican 50%.
Maíz	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Pasto de cuaresma	1,2 a 1,8 l/ha		En presiembra, pre emergencia o post emergencia del cultivo. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Dosis:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

	(*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Suelos livianos: 1,2 l/ha. Suelos medianos: 1,5 l/ha. Suelos pesados: 1,8 l/ha.
	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)*	0,9 + 1,8 a 2 l/ha de atrazina 50%		En presiembra, pre emergencia o post emergencia del cultivo. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza.
Maní	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)* Eleusine (*Eleusine indica)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	Según suelos.		Para Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, NE de La Pampa: En pre emergencia. NUNCA deberán haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos livianos: 1000 + 800 de imazetapyr 10%. Suelos medianos: 1250 + 800 de imazetapyr 10%. Para SE de Buenos Aires: En pre emergencia. NUNCA deberán haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos livianos: 1000 + 1000 de imazetapyr 10%. Suelos medianos: 1250 + 1000 de imazetapyr 10%.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)*			Para SE de Buenos Aires: En pre emergencia. NUNCA deberán haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos livianos: 1000 + 1000 de imazetapyr 10%. Suelos medianos: 1250 + 1000 de imazetapyr 10%.
Poroto	Afata (*Sida rhombifolia)* Torito (*Acanthospermum hispidum)* Yuyo cubano (*Tithonia tubaeformis)*	1 l/ha		En pre emergencia. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Se obtiene un control parcial del torito y yuyo cubano con valores de 60 a 65%. Recomendación válida para los suelos típicos del noroeste argentino.
	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Farolito (*Nicandra physaloides)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	0,8 l/ha		
Soja	Afata (*Sida rhombifolia)* Torito (*Acanthospermum hispidum)* Yuyo cubano (*Tithonia tubaeformis)*	1 l/ha		
	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Farolito (*Nicandra physaloides)* Saetilla (*Bidens pilosa)*	0,8 l/ha		
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)*			

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			
	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)*	0,9 l/ha		En presiembra, pre emegencia y post emergencia del cultivo. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Únicamente en mezcla con 700 a 800 cm3/ha de metribuzín 48% o 500 a 550 g/ha de metribuzín 75%. El control del chamico dependerá del metribuzín, pudiendo no alcanzar el 100%.
	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	1,2 a 1,8 l/ha		En presiembra, pre emergencia o post emergencia del cultivo. NUNCA deberá haber nacimiento de maleza. Dosis: Suelos livianos: 1,2 l/ha. Suelos medianos: 1,5 l/ha. Suelos pesados: 1,8 l/ha.
	Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			
Sorgo	Bejucos (*Ipomoea spp.)* Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)* Eleusine (*Eleusine indica)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	Según suelos.		Para SE de Buenos Aires, Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba y NE de La Pampa: En pre emergencia. NUNCA deberán haber nacimientos de malezas. Dosis: Suelos livianos: 1000. Suelos medianos: 1250. La semilla deberá tratarse con un protector de semilla a base de oxobetrinil 70%.

Información General:

Dimetenamida es un herbicida para usar en aplicaciones de presiembra, pre emergencia o post emergencia temprana en maíz, soja, poroto, girasol, maní, algodón y sorgo granífero. Controla gramíneas anuales y algunas latifoliadas.
El principio activo penetra dentro de la planta primariamente a través de los coleóptiles en desarrollo de las gramíneas en germinación, o los hipocótiles de las latifoliadas. Las malezas sensibles mueren antes de emerger o bien inmediatamente después de salir a la superficie. Su residualidad en el suelo depende de las características de éste y de las condiciones climáticas y las labores realizadas en el cultivo.
Puede ser aplicado con equipos terrestres provistos de boquillas de abanico plano con un volúmen de 150 a 200 l/ha de agua. Los mejores resultados se obtienen con el suelo lo más desmenuzado posible, sin grandes cascotes, ni malezas nacidas, arraigadas o grandes.
El producto forma una zona tratada en el suelo que controlará las malezas a medida que germinen. Por ello se deberá realizar la aplicación lo más cercano posible a la siembra, de manera que no haya malezas nacidas o emergiendo. El herbicida necesita de la humedad del suelo para “activarse” por lo que si, dentro de los 7 a 10 días de aplicado se presenta tiempo seco, deberá ser incorporado mecánicamente en forma superficial al suelo. Los tratamientos en postemergencia temprana del cultivo, se deberá realizar sin malezas a la vista.
Posteriormente, se podrán realizar las labores comunes de los cultivos pero en forma superficial, evitando traer suelo sin tratar a la superficie.
En caso de aplicarse a cultivos de siembra directa, se recomienda aumentar el caudal de agua en un 50%, lo mismo que la presión de trabajo del equipo, para penetrar la cobertura de residuos.
Compatibilidad: es compatible con otros herbicidas comunes a dichos cultivos tales como: atrazina, metribuzín, linurón, imidazolinonas, etc.
Fitotoxicidad: no se ha observado en condiciones normales.
Restricciones de uso: dejar transcurrir 30 días entre aplicación y cosecha. No aplicar cuando hay malezas nacidas o suelo mal preparado.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción, de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): K3(HRAC) ó 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda (ratas): 2400 mg/kg.
DL 50 dermal aguda (ratas): > 2000 mg/kg.
CL 50 inhalación aguda > 3,39 mg/l.

La formulación es levemente irritante a la piel, moderadamente irritante a los ojos y produce sensibilización dérmica en ensayos en cobayos.
No tiene potencial mutagénico. No tiene efectos sobre la reproducción o en el desarrollo. Es rápidamente excretado.
Tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: moderadamente tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves y moderadamente tóxico para organismos acuáticos. Basados en datos de mortalidad, se observó que el producto no es tóxico para lombrices de tierra.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.