# DIMETOATO

**Marcas comerciales**: DIMETOATO SIGMA - ROGOR PLUS.

**Nomenclatura Química:**
dimetoato: N- monometilamida del ácido dioxidimetil-ditiofosforilacético o O,O-dimetil-S-metilcarbamoilmetil fosforoditioato.
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** organofosforado.
**Acción:** de contacto, sistémica e ingestión.

**Uso:** insecticida.

| Cultivo | Plaga | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Achicoria<br>Ajo<br>Batata o boniato<br>Cebolla<br>Hortalizas<br>Papa<br>Puerro<br>Remolacha | Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)*<br>Pulgón del haba (*Aphis fabae)*<br>Pulgón del repollo (*Brevicoryne brassicae)*<br>Pulgón verde del alcaucil (*Capitophorus eleagni)*<br>Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*<br>Trips de la cebolla (*Thrips tabaci)*<br>Trips del poroto (*Caliothrips phaseoli)*<br>Trips del tomate (*Frankliniella paucispinosa)* | PC 40%: 75 - 125 cm3/hl | 7-14 (*) | Aplicar cuando se nota la presencia de la plaga, repitiendo en caso necesario a los 15 días.<br>Dosis por hectárea dimetoato al 40%: 250 - 375/390 cm3. |
| Alfalfa | Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)* | PC 40%: 500 cm3/ha | 7 | Vigilar atentamente el cultivo al comenzar la época crítica.<br>Aplicar en caso necesario cuando la cantidad de isocas presentes produzcan daño económico.<br>Cuando se observen 4 o 5 isocas/m2. (**) |
| | Pulgón de la alfalfa (*Acyrthosiphon pisum)*<br>Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)*<br>Pulgón negro de las leguminosas (*Aphis craccivora)* | PC 40%: 500 - 600 cm3/ha | | Cuando se observen los primeros pulgones. |
| Algodón | Acaro tejedor (**) *(Tetranychus urticae)* | PC 40%: 320-430 cm3/ha | 14 | Cuando el 10% - 20% de las hojas presenten síntomas de ataque inicial. |
| | Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)* | PC 40%: 250 - 300 cm3/ha | | Control temprano en plantas de 3 a 4 hojas, cuando se registren 5 a 8 pulgones promedio por hoja.<br>Control tardío en plantas de más de 6 hojas, cuando se registren 20 a 30 pulgones por hoja. |
| | Trips (*Thrips spp.)* | | | Efectuar las aplicaciones cuando el grado de infestación lo justifique. En el caso de ataques tardíos con cultivo muy desarrollado y denso utilizar la dosis mayor.<br>Control temprano en plantas de 3 a 4 hojas, cuando haya 50 trips en 100 brotes. (**)<br>Control tardío en plantas de más de 6 hojas, cuando haya 80 trips en 100 brotes. (**) |
| Caña de azúcar (**) | Chicharrita de la caña de azúcar (*Tapajosa rubromarginata)* | PC 40%: 320-430 cm3/ha | 7 | Al aparecer la plaga sobre las cepas. |
| Cereales (trigo, cebada, avena y centeno) | Pulgón amarillo (*Metopolophium dirhodum)*<br>Pulgón de la espiga (*Macrosiphum avenae)* | PC 40%: 800 - 1000 cm3/ha | 20 | Aplicar cuando se observen ataques primarios o sea al aparecer los primeros manchones en el cultivo. En caso de aplicaciones aéreas no emplear caudales menores de 20 l/ha. |
| | Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)* | PC 40%: 250 - 300 cm3/ha | | |
| Césped (canchas de golf, tenis, etc.)<br>Jardines | Grillo topo (*Scapteriscus spp.)* | PC 40%: 1000 cm3/ha en no menos de 100 litros de agua | | Según infestación realizar dos aplicaciones, una en primavera y otra en otoño. Se recomienda luego de una lluvia o riego. |
| Olivo | Cochinilla del delta (*Lecanium deltae)*<br>Cochinilla harinosa de los citrus (**) (P*seudococcus cit*ri)<br>Cochinilla negra (*Saissetia oleae)* | PC 40%: 150 cm3/hl | | Se recomienda efectuar las aplicaciones en primavera-verano, a partir del momento de larvación, continuándolas cada 20/25 días en caso necesario. Es conveniente adicionar a la dosis indicada de Rogor Plus y DIMETOATO SIGMA 0.5 a 1% de aceite emulsionable |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii)* Cochinilla roja común (*Chrysomphalus dictyospermi)* Coma o Serpeta (**) (Lepodosaphes beckii) | | | |
| | Mosca americana (**) *(Anastrepha fraterculus)* Mosca del mediterráneo (*Ceratitis capitata)* | PC 40%: 75 cm3/hl | | Cuando la fruta comienza a tomar color o pocos días antes. Con el agregado de algún atractivo, actúa como cebo tóxico.. |
| | Pulgón de los citrus (**) *(Toxoptera aurantii)* | PC 40%: 150 cm3/hl | | Aplicar cuando se observen los primeros ataques. |
| | Trips de la cebolla (**) (*Thrips tabaci)* | PC 40%: 75 –125 cm3/hl | | |
| Damasco Duraznero | Mosca del mediterráneo (*Ceratitis capitata)* | PC 40%: Durazno: 125 cm3/hl / Damasco: 75 cm3/hl | | Damasco: cuando los frutos comienzan a "pintar" o pocos días antes. Duraznero: pulverizar aprox. 20 días antes de maduración. En variedades de maduración lenta puede ser necesario efectuar una segunda pulverización a los 10 días de la primera. |
| | Pulgón verde (Myzus persicae) Pulgón negro (Anuraphis persicae niger) | PC 40%: 75 cm3/hl | | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. |
| Florales | Pulgón del crisantemo (**) (Macrosiphoniella sanborni) Pulgón del rosal (*Macrosiphum rosae)* Pulgón verde del duraznero (**) *(Myzus persicae)* Trips (**) (T*hrips spp.)* | PC 40%: 75 - 100 cm3/hl | | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. |
| Manzano Peral | Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)* | PC 40%: 150 - 200 cm3/hl | 7 | Manzano: al observar más de 4-5 ácaros/hoja. Peral: al observar más de 1-2 ácaros/hoja. Repetir en caso necesario, a los 10-15 días. |
| | Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)* | PC 40%: 100 – 200 cm3/hl (**) | | |
| | | PC 40%: 100 cm3/hl | | |
| | Gusano de la pera y la manzana (*Carpocapsa pomonella)* | | | Efectuar la 1ra. aplicación cuando hayan caído las 3/4 partes de los pétalos. Repetir cada 15 días hsta 3 semanas antes de la cosecha. En caso de existir servicio oficial de alarma, seguir sus instrucciones. |
| | Psílido del peral (*Psylla pyricola)* | PC 40%: 75 - 100 cm3/hl | | Primera aplicación en yema hinchada. Repetir cuando hayan caído los pétalos. |
| | Trips del peral (Taeniothrips inconsequens) | | | Aplicar en yema hinchada. Repetir en caso necesario a los 15 días / (**) cuando hayan caído los pétalos . |
| | Pulgón lanígero del manzano (*Eriosoma lanigerum)* Pulgón verde del manzano (*Aphis pyricola)* Pulgón verde de los citrus (**) *(Aphis citricola)* | PC 40%: 75 cm3/hl | | Aplicar en cuanto se observen los primeros pulgones en la parte aérea de las plantas |
| Praderas | Tucuras (*Dichroplus spp.)* | PC 40%: 800 - 1000 cm3/ha | | Cuando se hayan generalizado los nacimientos y la plaga esté en estadios de mosquita-saltona, antes que comience a dispersarse. Las aplicaciones deben realizarse en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde. (**) |
| Soja | Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)* | PC 40%: 1000 - 1500 cm3/ha | 14 | Cuando se registren 2 chinches por metro lineal de cultivo, después de floración. |
| Sorgo | Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)* | PC 40%: 500 - 700 cm3/ha | 7 | Aplicar cuando haya un 90% de las panojas emergidas y un 10% en floración o cuando se detecte una mosquilla por panoja. Repetir a los 5 días. |
| Tabaco | Gusano cogollero (*Heliothis virescens)* | PC 40%: 2400 cm3/ha | 14 | Al aparecer las primeras larvas. |
| | Marandová de las solanáceas (*Protoparce sexta paphus)* | | | Cuando se detecten las larvas neonatas y el 3er. estadío de desarrollo |
| | Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)* Pulguilla (*Epitrix argentinensis)* | PC 40%: 530 cm3/ha | | Aplicar al aparecer la plaga, repitiendo a los 10 días en caso necesario. |
| | Trips | PC 40%: 640 cm3/ha | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (*Thrips spp.)* | | | |
| Yerba mate | Psílido de la yerba mate (*Gyropsylla spegazziniana)* | PC 40%: 600 cm3/ha. | 7 | 1era) Cuando las yemas de brotación comienzan a hincharse para permitir la salida de las hojitas.<br>Esta pulverización combate adultos que desovan en las hojitas muy tiernas.<br>2da) 8 días después de la primera. Controla ninfas que nacieron de huevos colocados en hojitas que pudieron haber sido parasitadas y también adultos que hubieran nacido de "rulos" de plantas no cosechadas.<br>3ra) 8 días después de la segunda. Controla ninfas y adultos que escaparon de los tratamientos anteriores. Volumen de agua: 400 a 500 l/ha. |

(*)- TC: LAS PARTES COMESTIBLES DE LOS VEGETALES TRATADOS CON ESTE INSECTICIDA NO DEBEN SER COSECHADAS HASTA 20 DIAS DESPUES DE LA ULTIMA APLICACION CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: Alfalfa, Sorgo forrajero, Manzano, Pera, Papa, Batata, Achicoria, Remolacha, Yerba Mate: 7 días
Algodón, Tabaco, Ajo, Cebolla, Puerro, Soja: 14 días
Olivo, Duraznero, Damasco, Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Sorgo, Césped y Jardines: 20 días.
Florales y tabaco: exento
(**) Recomendaciones para producto SIGMA AGRO.

**Información General:**

Es un insecticida-acaricida de acción sistémica y residual. Actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.

Rogor Plus es una fórmula desarrollada de color azul que retrasa la degradación del dimetoato además de tener bajo olor. Insecticida con propiedades sistémicas que actúan sobre ácaros y numerosos insectos inhibiendo la colinesterasa con una persistencia de 2 a 3 semanas. Las plantas lo absorben y se traslada en forma sistémica. Se degrada en pocos días, no dejando residuos nocivos.

Equipos de aplicación
Este producto se emulsiona en agua.
Puede aplicarse con cualquier tipo de equipo. Para equipos aéreos se deberán utilizar volúmenes de agua no menores a 20 l/ha. Las concentraciones están indicadas para equipos de alto volumen. Cuando se usen equipos de bajo volumen se elevarán las concentraciones tantas veces como disminuya el volumen de agua aplicado por ha o por planta.
Mantener un número de gotas de 20 – 70 gotas/cm2.
Debe efectuarse un cuidadoso lavado de los elementos y equipos a utilizar, sobre todo si contienen restos de productos alcalinos o herbicidas.
No trabajar en condiciones climáticas desfavorables: altas T°, baja humedad relativa, sequía, insolación y vientos superiores a 12 km/h.
No es necesario retirar los animales que pudieran encontrarse en el lugar, pero los mismos no podrán ser sacrificados antes de 10 días de la fecha de tratamiento.

Compatibilidad
Es incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Algunas formulaciones de azufre no son compatibles con el dimetoato. Aplicar con cautela sobre naranjo, olivo, duraznero y cultivos florales, pues algunas variedades son sensibles a este insecticida. Los restos de producto se inactivan por tratamiento con soda cáustica o por incineración.
DIMETOATO SIGMA: puede mezclarse con aceite emulsionable e insecticidas y fungicidas de reacción neutra.

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 1 (IRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Utilizar protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.
Finalizado el tratamiento, lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la aplicación. No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No emplear ropa que haya tenido contacto con el producto sin previo lavado. No recorrer el área tratada sin la protección adecuada.

**Información Toxicológica:**

Del principio activo:
DL 50 oral aguda (rata): 320 - 380 mg/kg
DL 50 dermal aguda (rata): 400 mg/kg

Del producto formulado al 40%:
DL 50 oral aguda en rata: 550 mg/kg
DL 50 dermal aguda en conejo: > 2000 mg/kg

CL 50 Inhalatoria: > 2,25 mg/l - CUIDADO

Leve Irritante ocular y no irritante dermal

Del producto FMC:
Producto moderadamente peligroso. CLASE II. Toxicidad Inhalatoria: Categoría III – CUIDADO.
Irritación Ocular: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) Categoría III: causa irritación moderada a los ojos. No irritante dermal.
Sensibilizante dermal: el contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
Aplicar tratamiento para productos organofosforados. NO INDUCIR AL VOMITO.
Antídoto: Puede emplearse Sulfato de atropina 1 ó 2 mg cada hora, por vía oral o endovenosa, hasta completa dilatación de las pupilas. No administrar Atropina a personas cianóticas.

Del producto SIGMA AGRO:
Inhalación: Categoría III (CUIDADO)
Ojos: Moderado irritante ocular. (CUIDADO) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos.
Piel: No irritante dermal.
Ingestión: este producto es Moderadamente Peligroso (NOCIVO).
Toxicidad aguda.
Oral DL50: macho y hembra: 300-2000 mg/kg
Dermal DL50: macho y hembra: mayor a 2.000 mg/kg
Inhalación CL50: macho y hembra: >3,56 mg/L l
Irritación de la piel: No irritante dermal. Sensibilización de la piel: SENSIBILIZANTE: el contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
Irritación para los ojos: Moderado irritante ocular.
Toxicidad sub-aguda: no determinado.
Mutagénesis: NO MUTAGÉNICO

Riesgos ambientales:

Del producto formulado al 40%:
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico. No aplicar en lugares cercanos o sobre los dormideros, áreas donde se alimentan activamente o estén nidificando o lugares de reproducción de las mismas.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. Solicitamos considerar una franja mínima de 10 metros, a fin que la deriva de la aplicación no afecte a organismos acuáticos.
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. No aplicar en las cercanías de colmenas, en cultivos en floración y en el horario de pecoreo de las abejas. Si no pueden retirarse las colmenas, se deben tapar la entrada de las piqueras con una arpillera húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano. Avisar a los vecinos que se aplicará un producto riesgoso para las abejas.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMETOATO SIGMA | SIGMA AGRO SA | 40746 | EC | 40% | II |
| ROGOR PLUS | FMC | 37004 | EC | 40% | II |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**