DIMETOMORF + MANCOZEB

Marcas comerciales: ACROBAT MZ.

Nomenclatura Química:
dimetomorf: (E,Z) 4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil]morfolina
mancozeb: etilen bis (ditiocarbamato) de manganeso (polímero) complejo con sal de zinc
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido cinámico + ditiocarbamato.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	2 - 2,5 kg/ha con intervalos de 7 - 14 días.	7	Aplicar el producto en forma preventiva a partir de que haya condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración y hasta el final del cultivo si fuera necesario. Cuando las condiciones climáticas sean muy favorables para la enfermedad se recomienda el menor intervalo entre aplicaciones y la mayor dosis.
		Como curasemilla: 0,2 kg por cada 100 kg de papa cortada.		Inmediatamente después de realizado el corte, antes que comience la suberización.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	2,5 - 3 kg/ha con intervalos de 7 - 14 días.	60	Aplicar el producto en forma preventiva a partir de que haya condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración y hasta el final del cultivo si fuera necesario.

Información General:

Es un fungicida recomendado para el control del tizón tardío de la papa (Phytophtora infestans) y de la peronóspora de la vid (Plasmopara viticola) combina la acción de dos principios activos, dimetomorf y mancozeb. Posee acción preventiva y antiesporulante.

El dimetomorf es un fungicida omicetal que actúa por interrupción de la formación de la pared celular de los hongos. Interfiere en el normal crecimiento del hongo y puede llevar a lisis de la pared celular y muerte de las células. Tiene actividad durante las fases del ciclo biológico en que tenga lugar crecimiento activo. La actividad antiesporulante del dimetomorf disminuye notablemente el potencial de diseminación de la infección.
En las aplicaciones foliares el dimetomorf es absorbido por la hoja y es traslocado dentro de ésta (movimiento translaminar).
Por su parte, el mancozeb es un fungicida protector que permite ampliar el rango de acción contra diferentes hongos, y por ser fungicida de diferente modo de acción que el dimetomorf, contribuye a evitar la aparición de razas resistentes.
Como una práctica general de manejo de resistencia de hongos a fungicidas se recomienda aplicar este producto secuencialmente con otros fungicidas registrados para el control del tizón tardío de la papa con distinto modo de acción.

Preparación de la solución
Aplicaciones foliares: emplear equipo pulverizador con agitador. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada del producto al tanque pulverizador. Luego completar la carga del tanque con agua. El caldo será agitado por algunos instantes antes de comenzar la aplicación.
Aplicación al corte de papa "semilla": emplear un equipo pulverizador manual o mecánico (tipo mochila). Llenar el depósito de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia, agregar la cantidad recomendada del producto y luego completar con agua. El caldo deberá ser agitado por algunos instantes antes de comenzar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Para el cultivo de papa (aplicaciones foliares): este producto debe ser aplicado con pulverizadores de arrastre o tres puntos equipados con barra y botalón con o sin caños de bajada (dependiendo del tamaño del cultivo), de manera de cubrir totalmente el follaje del cultivo.
Ello requiere una aplicación de alto volumen (400 a 800 l/ha, dependiendo del tamaño del cultivo) con boquillas de cono hueco y que trabajen a la presión recomendada.
Se debe verificar la calidad del agua para evitar el uso de aguas duras y así lograr una mayor eficacia del producto.
Aplicación al corte de papa "semilla": una vez preparada la solución, asperjar sobre los cortes de papa "semilla" inmediatamente después de realizado el corte, antes que se produzca la suberización del mismo. El volumen a utilizar dependerá de la cantidad de cortes a tratar, siendo el ideal aquel que permita una buena disolución del producto en el caldo y un mojado uniforme. La presión deberá mantenerse constante a fin de asegurar una adecuada dosificación.
Importante: la aplicación del producto debe realizarse antes de la suberización del corte, caso contrario el producto puede no ser absorbido por el tubérculo. El producto como curasemilla, solo debe usarse en tubérculos cortados, no en tubérculos enteros.

Para cultivos de vid: debe ser aplicado con pulverizadores o atomizadores de arrastre. El volumen de aplicación debe ser de 600 a 800 l/ha para vides conducidas en espalderas y de 800 a 100 l/ha en parrales.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados. Posteriormente limpiar y enjaguar el área de derrame evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Adsorber el líquido de enjuague con material adsorbente como arcilla o aserrín y colocarlo en el mismo contenedor cerrado con el resto del producto derramado.

Clasificación (modo o sitio de acción): 40 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Barbijo.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 2770 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg.
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y organismos acuáticos:	Extremadamente tóxico

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con el producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACROBAT MZ	BASF ARGENTINA	33359	WP	9% + 60%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.