DODECADIENOL E8 E10

Marcas comerciales: RAK CP - RAK CP M - RAK CP PLUS.

Nomenclatura Química:
E8 E10 - dodecadienol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: dienol.
Acción: confusión sexual.

Uso: feromona (RAK CP Y RAK CP PLUS Y RAK CP M).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Frutales de pepita	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	500 cápsulas/ha		2 a 5,5 m. (*). El producto debe aplicarse previo al comienzo del primer vuelo de Cydia pomonella (70 - 90 Carpogrados - coincidente con la floración de la var. Red Delicious en el Alto Valle del Río Negro). Después, entre los 200 y 250 Carpogrados, complementar con tratamientos fitosanitarios para controlar la primera generación de Cydia pomonella; luego y de acuerdo al monitoreo de trampas 10X o de frutos, determinar la decisión de complementar con tratamientos fitosanitarios adicionales.

(*) Colocar las cápsulas hasta 50 cm por debajo de la altura máxima promedio de los árboles.
Distribuir uniformemente las cápsulas colgándolas de las plantas a las alturas recomendadas. La dosis recomendada (500 cápsulas/ha) corresponde a una distribución de 1 cápsula dentro de una superficie de 20 m2 de monte. Considerando los diferentes sistemas de plantación, es importante hacer un correcto diseño de distribución de las cápsulas para respetar la dosis recomendada: 1 cápsula/20 m2 (500 cápsulas/ha). También colocar difusores en el área circundante al monte a tratar (bordura) en una franja de 50 m., reforzando las dosis hasta en 15% en las zonas por donde ingresan los vientos predominantes, colgándolas de alambrados, cortinas forestales u otras plantaciones frutales.

Información General:

Producto elaborado para el control de Cydia pomonella en frutales de pepita (manzano - peral) mediante el sistema de confusión sexual. Si bien pueden estar expuestos otros insectos, se trata de una feromona específica por ende no sé espera alteración alguna. Existen distintas presentaciones conocidas como dispensers o difusores cuyas formas van desde capsulas, tiras, hasta espirales.

En el caso de cápsulas difusoras evaporables (dispenser), cada una contiene en su interior feromona femenina de Cydia pomonella que difunde al ambiente a través de sus paredes. La difusión producida por una distribución homogénea de las cápsulas en el monte frutal genera una nube de feromona que permanentemente satura los órganos receptores del macho, impide la comunicación con las hembras y la posterior cópula, de manera que al disminuir las fecundaciones se reduce la descendencia y por ende los daños al cultivo. El producto contiene feromona suficiente como para liberar durante 4 meses (formulación al 6%) o 6 meses (formulación al 12%) en condiciones de campo. Se adapta a programas de manejo integrado de plagas (IPM) y de producción orgánica de frutas.

Recomendaciones de uso
Características del monte a tratar: el monte debe presentar baja presión de Cydia pomonella (< de 2% de daño en fruto en cosechas anteriores) y plantas de forma, estructura y tamaño homogéneo. El monte debe estar alejado de montes frutales abandonados, galpones de empaque, luces de mercurio o aislado de posibles fuentes de contaminación. El tamaño de las parcelas (forma rectangular - cuadrangular) debe superar las 3 has, para obtener - en las condiciones enunciadas - niveles de control aceptables.
Monitoreo de la plaga y evaluación de eficacia: revisar periódicamente el monte luego de la colocación de las cápsulas observando los frutos durante el raleo (noviembre) y al finalizar el desarrollo de las larvas de la primer generación (principios a mediados de diciembre). Luego de estas evaluaciones continuar los muestreos quincenalmente hasta pre-cosecha. Tamaño de muestra: se puede tomar como referencia de 500 a 1000 frutos/ha, extraídos de 20 a 25 plantas de todos los puntos de la parcela (con mayor cantidad de plantas en los perímetros).
Umbral de daño: 1% de frutos afectados. Para el seguimiento de la eficacia de la técnica, deben emplearse trampas, correctamente instaladas de mayor contenido de feromonas que las convencionales, es decir > a 10mg de principio activo en el cebo, colocando 1 trampa cada 2 hectáreas. La ausencia de caídas de Cydia pomonella en las trampas es un indicio de su funcionamiento pero no una prueba suficiente de su eficacia. Como umbrales de captura (supertrampa Trècè 10X = 10 mg principio activo), se consideran 4 mariposas(machos)/trampa/semana durante la primer generación y 5 mariposas (machos)/trampa/semana en la segunda generación. Si los daños por Cydia pomonella superan los umbrales referidos: 1) en la evaluación de frutos (1% de frutos afectados) o 2) en el monitoreo con supertrampas Trècè (4 mariposas/ trampa/semana en la primer generación o 5 mariposas/trampa/semana en la segunda generación) recomendamos la aplicación de insecticidas específicos.

Uso: feromona (tiras emisoras).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano Peral	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	PC 6%: 300 tiras emisoras/ha		Al registrarse la primer captura en las trampas. Evitar su uso en lotes con antecedentes de alta infestación.

Información General:

Las tiras emisoras preparadas para colgar de las ramas de los frutales contienen un reservorio de feromona que satura el ambiente, lo cual impide que el macho localice a la hembra para su fecundación evitando la postura de huevos y el nacimiento de larvas.
Se deben colocar 300 tiras emisoras por hectárea, tomando en cuenta la altura de los árboles (se colocan en el tercio superior), los vientos (se debe colocar una cortina protectora del lado del viento predominante) y los antecedentes de infestación del monte.
Al existir riesgo de apareamiento casual este sistema no es recomendable en montes con altas infestaciones.
El seguimiento del monte frutal debe efectuarse como mínimo dos veces por semana, visualmente sobre los frutos o con trampas alimenticias.
Las tiras deben colocarse cuando se registre la primera captura en la trampa de monitoreo a principios de temporada y recambiarlas entre los 60 y 75 días de la primera colocación y subsiguientes hasta cubrir el período deseado (cosecha).
Restricciones de uso: exento.
Importante: las tiras emisoras sólo se sacarán de su envase original en el momento de aplicación.

Derrames:
Recoger en forma mecánica o manual.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar la inhalación, el contacto con la piel, la ingestión y la contaminación de los alimentos.
Protección de las manos, guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos. Protección de los ojos, gafas protectoras con protección lateral. Utilizar protección respiratoria adecuada. Protección de la piel y cuerpo, seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos.

Medidas específicas de higiene
No comer, beber o fumar durante el manipuleo. Cambiarse la ropa contaminada. Guardar por separado la ropa de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Información Toxicológica:

	Para formulado al 6 %	Para formulado al 7,6 %	Para formulado al 12 %
Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg	DL 50: > 5000 mg/kg	DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg	DL 50: > 2000 mg/kg	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5.26 mg/l	CL 50: > 5.26 mg/l	CL 50: > 5.26 mg/l
Irritación dermal:	Irritante	Irritante	Irritante
Irritación ocular:	No irritante	No irritante	No irritante
Sensibilización cutánea:	Sensibilizante	Sensibilizante	Sensibilizante

Primeros auxilios
Por la naturaleza y presentación del producto difícilmente puede ocurrir una intoxicación, pero ante cualquier contacto con el producto buscar ayuda médica.
Evitar la inhalación, retirar al aire fresco, mantener en reposo y pedir asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos con los párpados abiertos.
En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón
En caso de ingestión, enjuagar la boca y beber abundante agua.
Evitar el contacto con los alimentos.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

En peces no se espera exposición. Para abejas, si bien hay exposición, no se esperan efectos adversos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RAK CP	BASF ARGENTINA	33785	VP	6%	IV
RAK CP M	BASF ARGENTINA	36835	VP	7,6%	III
RAK CP PLUS	BASF ARGENTINA	33674	VP	12%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.