EPOXICONAZOLE + KRESOXIM METIL

Marcas comerciales: ALLEGRO.

Nomenclatura Química:
epoxiconazole: (2RS, 3SR)-3-(2 clorofenil)-2-(4-fluorofenil) -2-[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil]oxirane.
kresoxim metil: (metil (E) -2-metoxi imino-2-[2-(o-toliloximetil) fenil] acetato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + estrobilurina.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	Mancha agregada de la vaina (*Rhizoctonia oryzae-sativae)* Mancha de la vaina (*Rhizoctonia oryzae)* Mancha marrón angosta (*Cercospora oryzae)* Podredumbre de la vaina del cuello (*Gaeumannomyces graminis var. graminis)* Podredumbre del tallo (*Sclerotium oryzae)* Tizón de la vaina (*Rhizoctonia solani)*	0,75 - 1 l/ha	45	Aplicar preventivamente desde embuche hasta comienzo de emergencia de las panojas, si hubiera condiciones predisponentes para las enfermedades, o a la aparición de los primeros síntomas de las mismas. Utilizar la dosis mayor en caso de alta presión de las enfermedades.
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)*		60	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* *Oídio de los cereales (Erysiphe graminis)* *Roya amarilla del trigo (Puccinia striiformis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Roya de la hoja (*Puccinia tritici)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*		45	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.

Información General:

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en el cultivo de trigo, cebada y arroz
Posee efecto preventivo, curativo y erradicante.
El producto contiene epoxiconazole, un nuevo triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica, de larga residualidad. El epoxiconazole tiene una sistemia acrópeta.
Contiene, además, kresoxim metil, un fungicida del grupo de las estrobilurinas, que permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia a los fungicidas IBE (triazoles) y contribuye al control fúngico. Este fungicida actúa por inhibición de la germinación de las esporas, del desarrollo del tubo germinativo y de la esporulación. Posee acción eposistémica.

Preparación:
Importante: agitar bien el envase antes de usar.
El producto debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego agregar el producto con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Complétese el depósito con agua.

Equipos de aplicación: puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo.
Aplicaciones terrestres: se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg.2. No utilizar volúmenes inferiores 150 l/ha.
Aplicaciones aéreas: el volumen no deberá ser inferior a 15 l/ha.

Restricciones de uso: evite la deriva sobre cultivos susceptibles como: frutales, hortalizas y viñedos
Período de carencia: trigo (grano) 45 días, cebada (grano) 60 días, arroz 45 días.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.

Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 5,3 mg/l.
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves. Muy tóxico para peces. Deberá evitarse la contaminación de estanques y cursos de agua. No aplicar cuando haya viento y no aplicar a menos de 5 metros de cursos de agua. No descargar el agua de lavado o envases en cursos de agua. Pulverizar la misma sobre caminos de tierra para su descomposición natural. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ALLEGRO	BASF ARGENTINA	33596	SC	12,5% + 12,5%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.