FENHEXAMID

Marcas comerciales: TELDOR 50 SC - TELDOR 50 WP.

Nomenclatura Química:
fenhexamid: 1-metil-ácido ciclohexano carboxílico (2,3-dicloro-4-hidroxi-fenil) - amida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: hidroxianilida.
Acción: de contacto.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Vid	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	1,20 kg/ha	3	De acuerdo a las condiciones predisponentes, se recomiendan aplicaciones en cierre de racimo y envero, para luego, y en caso de ser necesario, hacer aplicaciones adicionales según las condiciones antes mencionadas.
		1,20 l/ha		Aplicar vía liquida en estadíos críticos, con condiciones favorables para la enfermedad, (for, cierre de racimos, pinta y precosecha). Utilizar volumen de aplicación de 400 a 1.000 L/ha en espaldera y no más de 1.800 L/ha en parronal español. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada, evitando realizar aplicaciones consecutivas.

Información General:

Es un fungicida de contacto eficaz para el control de *Botrytis cinerea* en los cultivos susceptibles a este patógeno.

Instrucciones de uso:
Preparación: llene el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua limpia. Con el agitador en movimiento vierta la cantidad recomendada de fenhexamid y complete el tanque con agua.

Equipo de aplicación: puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como con mochilas de espalda.

Caudal: se recomienda aplicar hasta alcanzar el "punto de goteo", para lo cual los caudales a aplicar no varían de los tradicionalmente usados para los cultivos de vid y frutilla.
Fenhexamid es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; de todos modos se recomienda la realización de pruebas de compatibilidad previas en pequeña escala según el siguiente plan:
1° Utilizando una jarra de ¼ litro con agua en su interior, agregar la cantidad proporcional de producto a utilizar.
2° Agregar en el siguiente orden los productos según su tipo de formulación: WP, WG, SC, EC o SL.
3° Agitar enérgicamente el preparado.
4° Dejarlo descansar durante 5 minutos y determinar si permanece mezclado o bien puede ser re-mezclado fácilmente.
5° Luego de comprobado lo anterior, proceder en el mismo orden de adición para la mezcla a aplicar a campo.

La formulación polvo, debe ser aplicada espolvoreando directamente sobre los racimos.

Derrames:
Recoger el producto e introducirlo en envases perfectamente identificados y cerrados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 17 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación), anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Teldor 50 WP
DL50 oral aguda en rata: > 2000 mg/kg.
DL50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/kg.
CL50 inhalatoria aguda en rata: > 5057 mg/m3.

Leve irritante dermal
Severo irritante ocular.
No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: moderadamente tóxico.

Teldor 50 SC
DL50 oral aguda en rata: > 2500 mg/kg.
DL50 dermal aguda en rata: > 4000 mg/kg.
CL50 inhalatoria aguda en rata: > 322 mg/m3.

No irritante dermal
No irritante ocular.
No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: moderadamente tóxico

Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado o los accesos al mismo.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TELDOR 50 SC	AGRO BAYER SRL	42394	SC	50%	IV
TELDOR 50 WP	AGRO BAYER SRL	34295	WP	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.