FENITROTION + PERMETRINA

Nomenclatura Química:
fenitrotión: O,O dimetil,O-(3-metil-4-nitrofenil)fosforotioato.
permetrina: 2,2 dimetil-3-(2,2 diclorovinil)-1-ciclopropil carboxilato de cis-trans-3-fenoxibencilo.
Clasificación Química: organofosforado + piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Bodegas	Acaro de los granos almacenados (*Glyciphagus destructor)* Acaro de los granos almacenados (*Glyciphagus domesticus)* Acaro de los granos almacenados (*Tyrophagus putrescentiae)* Arañuela de la harina (*Acarus siro)* Carcoma achatada (*Cryptolestes ferrugineus)* Carcoma del tabaco (*Lasioderma serricorne)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Carcoma grande (*Tenebroides mauritanicus)* Gorgojo de Khapra (*Trogoderma granarium)* Gorgojo de los granos partidos (*Laemophloeus minutus)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Gusano amarillo de la harina (*Tenebrio molitor)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella)* Polilla de la harina (*Ephestia kuehniella)* Polilla de productos almacenados (*Ephestia elutella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*	2 l/hl		Pulverizar paredes pisos y techos (sin tierra o residuos que cubran las superficies) en forma uniforme, a razón de 10 litros de la emulsión por cada 100 m2. Mantener los lugares cerrados durante 48 horas. Considerar las restricciones para almacenamiento de granos.
Bolsas vacías				Previo al embolsado del grano. Considerar las restricciones para almacenamiento de granos.
Camiones Depósitos Galpones Silos				Previo a la entrada del grano a la instalación. Pulverizar paredes, pisos y techos (sin tierra o residuos que cubran las superficies) en forma uniforme, a razón de 10 litros de la emulsión por cada 100 m2. Mantener los lugares cerrados durante 48 horas. Considerar las restricciones para almacenamiento de granos.

Información General:

Producto para el control preventivo y curativo de plagas que atacan granos almacenados. Aplicado directamente sobre éstos, posee una acción específica sobre taladrillo de los granos dando un período de protección de 6 meses.

También puede usarse para tratamiento preventivo de instalaciones y vehículos.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ver información toxicológica de cada principio activo por separado.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.