FENOXAPROP P ETIL

Marcas comerciales: FOXTROT.

Nomenclatura Química:
fenoxaprop p-etil: (D+)-etil-2[4-(6-cloro-2-benzoxazolil-oxi)-fenoxi]-propanoato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: aril oxifenoxipropionato.
Acción: de contacto, sistémica y foliar.

Uso: herbicida (post-emergente al 11 %).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón Batata o boniato Cebolla Girasol Maní Papa Pimiento Soja Tomate Zanahoria	Alpiste (*Phalaris canariensis)* Avena gigante (*Avena sterilis)* Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (*Avena fatua)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Hierba pegajosa (*Setaria verticillata)* Panicum (*Panicum capillare)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)*	0,8 - 1,4 l/ha	45	Plantas desde 2 a 3 hojas hasta inicio del macollaje.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	1,2 - 1,5 l/ha		Plantas con estolones de hasta 5 cm de largo. Agregar coadyuvante 0,15%.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*	1,0 - 1,4 l/ha		Plantas de 4 a 6 hojas hasta las primeras plantas en estado de hoja bandera. Plantas de rizoma.
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	0,8 - 1,2 l/ha		Plantas de semilla. Plantas de 4 a 6 hojas hasta las primeras plantas en estado de hoja bandera.

Información General:

Modo y mecanismo de acción: herbicida selectivo con acción de contacto y sistémica; se absorbe por hojas y se moviliza tanto acrópetamente como basípetamente. La acción herbicida se localiza en los centros de crecimiento, donde afecta los tejidos meristemáticos en el eje de los tallos, en la base foliar, en las raíces y yemas subterráneas. El principal sitio de acción bioquímica es la inhibición de la biosíntesis de lípidos en los meristemas de las especies gramíneas susceptibles. Los síntomas de daño se manifiestan, luego de la aplicación, por reducción en el crecimiento, que se detiene completamente a los 2 - 3 días, necrosis de la base foliar y manchas rojizas seguidas por necrosis de las hojas.
Fenoxaprop p-etil es un herbicida selectivo, con una formulación que contiene más purificada la parte activa de la droga técnica para el control de avena fatua en cultivo de cebada.

Equipos y técnicas de aplicación:
La preparación del caldo de aspersión se realiza agregando primero agua al tanque hasta la mitad de su capacidad y luego el producto, agitándolo bien. Después se llena el resto del tanque con agua y se continúa la agitación hasta que se homogeinice la emulsión. En aplicación terrestre deberán usarse pastillas tipo abanico plano (8002 o 11002) y una presión de 35-45 lb/pulg2. El volumen deberá ser, en equipo convencional para sorgo de Alepo: 100 a 150 l/ha, gramíneas anuales 150-200 l/ha y para gramón 150-200 l/ha. En aplicaciones aéreas, se pueden utilizar boquillas de cono hueco D6/45 hasta D10/45 ó 46, o pastillas de abanico plano con menor ángulo de aspersión que en las aplicaciones con equipos terrestres (ej. Teejet 6506 - 6510 o 8006 - 9010) y aplicar un volumen mínimo de 30 l/ha.

Influencia de suelo y clima sobre la acción del p.a.: bajo condiciones de crecimiento favorables (elevada temperatura, buena humedad edáfica y ambiental) las malezas gramíneas de rápido crecimiento son sumamente sensibles a fenoxaprop p-etil. Bajo condiciones de sequía, las aplicaciones deberán ser postergadas. Luego de 1 a 2 horas de aplicado el producto es resistente a la lluvia. Suspender la aplicación cuando la velocidad del viento es mayor a 10 km/h.

Compatibilidad
Fenoxaprop p-etil: es compatible en mezcla de tanque con insecticidas, fungicidas y herbicidas de hoja ancha como el bentazón, siempre y cuando se apliquen las dosis recomendadas. Con los demás herbicidas de hoja ancha factibles de ser aplicados en soja, se presenta antagonismo en mayor o menor medida, debido al efecto de éstos sobre las gramíneas. En caso de aplicaciones separadas aplicar primero fenoxaprop p-etil y luego a los 3-5 días el herbicida de hoja ancha.

Restricciones de uso fenoxaprop p-etil no se debe aplicar este producto en cultivos de monocotiledóneas, tales como caña de azúcar, maíz, cereales, sorgo y arroz.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su disposición de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 11%:
DL 50 oral aguda en rata: > 3129 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en rata: 1,14 mg/l

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Contraindicación: no provocar vómito.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Muy tóxico para peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FOXTROT	FMC	38631	EW	11%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.