Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FENTOATO

Marcas comerciales: ELSAN.

Nomenclatura Química:
Ester etílico del ácido 0,0-dimetil ditiofosforil-1-fenil acético ó s-alfa-(etoxicarbonilbencil 0,0-dimetilfosforoditioato.
Clasificación Química: organofosforado.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	0,5 - 0,6 l/ha	7	Cuando se registren 4 a 5 isocas por metro cuadrado.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Oruga militar verdadera (*Pseudaletia adultera)*	0,85 - 1,4 l/ha		Aplicar en caso necesario antes de que la cantidad de larvas presentes produzcan "daño económico". En caso de hallarse varias especies, aplicar la dosis mayor.
	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	2,1 l/ha		Cuando se registren 3 a 4 isocas por metro cuadrado.
Algodón	Chinche tintórea (*Dysdercus chaquensis)*	1,7 - 2,1 l/ha		Cuando se observe la presencia de plagas.
	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)* Lagarta rosada (*Pectinophora gossypiella)*	1,7 - 2,6 l/ha		Cuando el 5 o el 10% de los capullos presentan larvas o sus daños.
	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	0,9 l/ha		Cuando se observan 5 orugas por planta.
Cereales	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Oruga militar verdadera (*Pseudaletia adultera)*	1,0 - 1,4 l/ha		Al capturar 15 - 20 larvas por cada 20 golpes de red.
Cítricos o citrus	Cochinilla acanalada de Australia (*Pericerya purchasi)* Cochinilla blanca del tronco (*Unaspis citri)* Cochinilla coma (*Mytilococcus beckii)* Cochinilla del delta (*Lecanium deltae)* Cochinilla harinosa de los citrus (*Pseudococcus citri)* Cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii)* Cochinilla roja común (*Chrysomphalus dictyospermi)*	100 - 120 cm3/hl	14	En octubre/noviembre y en febrero/marzo, épocas en que normalmente se registra la mayor cantidad de nacimiento de ninfas.
Forestales	Bicho canasto (*Oiketicus platensis)*	85 - 120 cm3/hl		Aplicar al notarse la presencia de las larvas de un tamaño mayor de 1cm de largo.
Frutales de carozo Frutales de pepita	Gusano de la pera y la manzana (*Carpocapsa pomonella)*	145 cm3/hl	14	Seguir indicaciones del Servicio de Alarma de Organismos Oficiales, en su defecto efectuar la primera aplicación cuando han caído 3/4 partes de los pétalos y repetir cada 20 días y hasta 2 semanas antes de la cosecha.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	1,7 - 2 l/ha	7	Aplicar al observar hasta 5 larvas por planta.
Lino		1,7 - 1,4 l/ha		Con 4 o más orugas por metro cuadrado.
	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	2,1 - 2,5 l/ha		Intervenir al comienzo del ataque. No aplicar sobre estadios larvales de avanzado desarrollo.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	1,2 - 1,7 l/ha		En soja de primera con 30% de los brotes atacados. En soja de segunda con 10 - 15% de los brotes atacados. A partir de la floración al notar los primeros daños en flores y vainas.
	Chinche verde (*Nezara viridula)*	0,9 - 1,3 l/ha		Cuando se observan más de 2 chinches por metro lineal desde floración.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*			Cuando se observan las primeras orugas.
Sorgo azucarado	Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)*	0,6 - 0,9 l/ha		Al inicio del ataque. Repetir de ser necesario, 7 días después.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Información General:

Además de su acción de contacto e ingestión posee penetración foliar localizada a nivel meristemático.

Modo y mecanismo de acción: inhibe la acción de la colinesterasa con interrupción de la actividad nerviosa. Por su rápida acción es recomendable para el control de insectos vectores de virus.

Propiedades físicas o químicas:
Apariencia: líquido oleoso amarillo rojizo. Olor: aromático.

Influencia del suelo y clima sobre la acción del P.A.: en condiciones extremas de baja humedad ambiental, el producto puede disminuir su acción insecticida. Lo mismo sucede al entrar en contacto con el suelo.
Equipos de aplicación: en aplicaciones terrestres aplicar como mínimo 150 litros agua/ha y en aplicaciones aéreas 30 l/ha de agua, cuidando de obtener un asperjado uniforme. Utilizar pastillas de cono hueco y presión entre 50 y 80 lb/pulg2.
Compatibilidad: puede combinarse con la mayoría de los fungicidas, insecticidas, herbicidas y coadyuvantes, con excepción de los productos de reacción alcalina. Sus mezclas con piretroides para determinadas plagas mejoran la acción individual de los productos.
Restricciones de uso: en variedades de manzana de piel roja, suspender los tratamientos cuando se inicia la coloración. Durante la aplicación, a las dosis recomendadas, no es necesario retirar los animales que pudieran encontrarse en el lugar, pero éstos no podrán ser faenados hasta después de 15 días del tratamiento.
NO debe ser utilizado en forma simultánea con el herbicida propanil, debiendo transcurrir por lo menos 10 días entre la aplicación del herbicida y la de este insecticida.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 Oral aguda en ratas: 300 - 440 mg/kg.
DL 50 Dermal aguda en ratas: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en rata: 0,39 mg/l.

Del producto formulado:
DL 50 Oral aguda en rata hembra: 325 mg/kg.
DL 50 Dermal aguda en rata macho: 1715 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en ratas: 5,025 mg/l.

Toxicidad crónica: en 2 años de estudios alimentando ratas con dosis de 10 - 30 y 100 ppm de fentoato, produjeron una moderada reducción de la colinesterasa de los eritrocitos. No hubo evidencias de cancerogénesis en ninguna dosis probada.
IDA: 0,86 mg/hombre/día.

Riesgos ambientales: altamente tóxico para abejas.
NO aplicar durante floración. Muy tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces.
La degradación es primordialmente microbiana, favorecida por la humedad y temperatura.

Antídoto: sulfato de atropina.
Contraindicaciones: adrenalina, derivados de teofilina y aminofilina.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ELSAN	BROMETAN	30858	EC	50%	II