Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

FENVALERATO



Nomenclatura Química:
Alfa-ciano-3-fenoxibencil-2-(4 clorofenil)-3-metil butirato.
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto, ingestión y repelencia.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Álamos	Bicho canasto (*Oiketicus platensis)*	PC 30%: 30 cm3/ha		Aplicar cuando se note la aparición de las larvas hasta que alcanzan 1 cm de largo .
Alfalfa	Gusano cortador o Gusano variado (*Peridroma saucia)*	PC 30%: 200 cm3/ha	4	Cuando se nota la presencia de la plaga.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	PC 30%: 100 cm3/ha		Cuando se nota la presencia de 5 orugas o más por m2.
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	PC 30%: 50 - 70 cm3/ha	21	Aplicar cuando se observa una infestación generalizada de 5 o más orugas por planta.
	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	PC 30%: 170 - 200 cm3/ha		Aplicar cuando se observan 10 larvas por cada 100 plantas o un 10% de pimpollos dañados.
Arveja o alverja	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)*	PC 30%: 200 cm3/ha	14	Cuando se observen adultos solamente y/o abundancia de huevos y larvas sobre los brotes en época de floración.
Cítricos o citrus	Mosca americana (*Anastrepha fraterculus)* Mosca del mediterráneo (*Ceratitis capitata)*	PC 30%: 33 cm3/hl	15	Mezclado con proteínas hidrolizadas. Pulverizar el sector N.E. de la copa.
Duraznero	Gusano del brote del duraznero (*Cydia molesta)*	PC 30%: 30 cm3/hl		Se deben aplicar los tratamientos de acuerdo con el Servicio de Alarma o a partir de la caída de los pétalos cada 20 días.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 30%: 150 - 200 cm3/ha	28	Cuando se nota la presencia de 4 a 5 isocas por planta.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	PC 30%: 200 cm3/ha		Cuando se nota la presencia de 3 a 5 isocas por planta.
Lino	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	PC 30%: 150 - 200 cm3/ha	15	Cuando los recuentos con red entomológica totalicen 30 ejemplares por cada 20 golpes.
Manzano Peral	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	PC 30%: 10 - 12 cm3/hl	14	Aplicar siguiendo las indicaciones del servicio de alarma correspondiente.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	PC 30%: 100 cm3/ha (*)	21	(*) Adicionar 700 cm3 de clorpirifós al 48% ó 400 cm3 de fenitrotión al 100%. Antes de floración cuando haya 30% de brotes atacados y a partir de la floración al observar los primeros brotes afectados.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	PC 30%: 80 - 100 cm3/ha (*)		(*) Adicionar 500 cm3 de endosulfán al 35% ó 350 cm3 de fenitrotión al 100%. Aplicar desde floración y cuando se observen 2 o más chinches por metro lineal de surco.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	PC 30%: 80 - 100 cm3/ha		Al observar más de 15 isocas por metro lineal y un daño que supere al 30% de la superficie foliar, antes de la floración. Desde la floración, cuando el daño al follaje sea mayor al 10%.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 30%: 100 - 120 cm3/ha		
	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	PC 30%: 200 cm3/ha		Con 3 a 4 isocas por metro lineal.
Sorgo	Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)*	PC 30%: 140 cm3/ha (*) PC 30%: 200 cm3/ha	28	(*) Adicionar 400 cm3 de fenitrotión al 100% ó 400 cm3 de clorpirifós al 48%. Cuando la floración del cuarto superior de las panojas se ha generalizado. Repetir a los 7 días.
Tomate	Polilla del tomate	PC 30%: 30 cm3/hl	4	Cuando se nota la presencia de la plaga.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

	(*Scrobipalpuloides absolutus)*			

Información General:

Propiedades físicas y químicas del principio activo: el grado técnico es amarillo viscoso o líquido marrón, a veces parcialmente cristalino a temperatura ambiente. Densidad 25/25: 1,175. Solubilidad (20 ºC): < 1 mg/l agua, a 23 ºC: > 1 kg/kg acetona, cloroformo, etanol, xileno, ciclohexanona. Estable al calor y a la luz solar, más estable en medio ácido que en medio alcalino. Estabilidad óptima a pH 4.
Compatibilidad: puede pulverizarse en mezcla con otros plaguicidas, siempre y cuando previamente se haya constatado que existe compatibilidad física y que no produce daños al cultivo bajo las condiciones de uso.
NO mezclar con productos a base de cobre, polisulfuro de calcio y compuestos de reacción alcalina.

Equipos: puede ser pulverizado con equipos terrestres de alto y bajo volumen y también con equipos aéreos. Con equipos terrestres de bajo volumen el caudal varía entre 70 y 100 l/ha. En tratamientos aéreos no aplicar volúmenes de agua menores a 10 l/ha. También se puede aplicar en mezcla con gasoil con volúmenes de 3 a 4 l/ha. En todos los casos la pulverización debe ser uniforme y cubrir bien el cultivo a tratar.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda en ratas en mg/kg: 451.
DL 50 dermal aguda en mg/kg: para ratas > 5.000; para conejos: 2.500.
CL 50 para peces (96 h) en mg/l: trucha arco iris 0,0036.

Tóxico para abejas.
Ratas alimentadas con 250 mg/kg de su dieta no mostraron efectos toxicológicos (Niseto).
IDA: 0,02 mg/kg

Antídoto: no se conoce uno específico.

Para mayor información ver capítulo “Emergencias médicas por Productos Fitosanitarios”, específicamente el tema insecticidas piretroides.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.