FIPRONIL

Marcas comerciales: CHIPCO CHOICE - FORMIDOR - REGENT 25 FS SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
fipronil: (1)-5-amino-1-(2,6-dicloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfinyl-pirazole-3-carbonitrilo.
Tipo de producto: químico**.**
Clasificación Química: fenilpirazol.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida (Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	Gorgojito acuático (*Oryzophagus oryzae)*	120 cm3/100 kg.		Antes de la siembra (hasta 30 días) con 1,8 litros de agua por cada 100 kg de semillas
Soja	Gorgojo de suelo (**) (*Pantomorus spp.)*	100-150 ml/100 kg de semilla		Antes de la siembra con 300-250 cm3 de agua por cada 100 kg de semillas.
	Picudo chico de la soja (*) (*Promecops spp.)*	125-150 cm3/100 kg de semilla		Antes de la siembra con 175- 210 cm3 de agua por cada 100 kg de semillas.
	Picudo grande de la soja (*Sternechus spp.)*			Antes de la siembra con 125-150 cm3 de agua por cada 100 kg de semillas

*aplicar junto con Curbix 35 FS (Ethiprole 35%) a dosis de 125-150 cm3/100 kg de semilla.
** aplicar junto con Curbix 35 FS (Ethiprole 35%) a dosis de 100-150 cm3/100 kg de semilla.

Información General:

AVISO REGULATORIO – RESOLUCIÓN SENASA 425/2021
De acuerdo con la normativa vigente, se encuentra prohibida en Argentina la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de formulaciones de Fipronil en Suspensión Concentrada (SC) y Gránulos Dispersables (WG).
Esta restricción no aplica a formulaciones destinadas a tratamiento de semillas (FS) ni a cebos (GB).

Uso: insecticida (Cebos (GB)).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas cultivadas Áreas no cultivadas	Hormiga cortadora colorada (*Acromyrmex striatus)* Hormiga isaú (*Atta vollenweideri)* Hormiga minera (*Atta sexdens)* Hormiga negra común (*Acromyrmex lundi)* Hormiga negra del sur (*Acromyrmex lobicornis)*	PC 0,003%: 10 g/m2		Aplicar el producto directamente con el envase evitando el contacto con las manos, al lado del camino de abastecimiento (donde están cargando hojas), próximo a los orificios activos.
Césped (Parques, canchas de deportes)	Grillotopo (*Scapteriscus borellii)*	PC 0,1%: 20 - 30 kg/ha (aplicación sub-superficial). PC 0,1%: 30 kg/ha (cobertura total).		Una sola aplicación por año: en primavera (preventiva) o en verano/otoño (curativa).

Información General:

Fipronil pertenece a una nueva clase de insecticidas de la familia de los fenil pirazoles este insecticida tiene efecto sobre el sistema nervioso central interfiriendo en la transmisión GABA (ácido gama amino butirico) sobre los canales del ión cloro.

Por tener una forma de acción distinta a todas las otras familias de insecticidas, este producto es ideal para rotaciones con el objeto de prevenir posibles resistencias.

Este producto puede ser degradado esparciéndolo durante 48 horas en una solución al 10% de soda cáustica.

AVISO REGULATORIO – RESOLUCIÓN SENASA 425/2021
De acuerdo con la normativa vigente, se encuentra prohibida en Argentina la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de formulaciones de Fipronil en Suspensión Concentrada (SC) y Gránulos Dispersables (WG).
Esta restricción no aplica a formulaciones destinadas a tratamiento de semillas (FS) ni a cebos (GB).

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior disposición de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 20%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 977 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 0,94 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: ALTAMENTE TÓXICO, no se espera exposición en tratamientos de semillas. Ante la presencia de colmenas en el área circundante al lote a tratar, debe darse aviso al apicultor responsable con la antelación suficiente para que éste pueda retirar las mismas y trasladarlas a una distancia equivalente al máximo vuelo de las abejas. En caso que el lote tratado se encuentre en floración no deben reingresar las colmenas al área de riesgo durante al menos 30 días.
Toxicidad para peces: extremadamente tóxico. No aplicar en cercanías de cursos de agua. Toxicidad para aves: moderadamente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CHIPCO CHOICE	AGRO BAYER SRL	33491	GB	0,1%	IV
FORMIDOR	AGRO BAYER SRL	00284	GB	0,003%	IV
FORMIDOR	AGRO BAYER SRL	33569	GB	0,003%	IV
REGENT 25 FS SEMILLERO	AGRO BAYER SRL	33121	FS	25%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.