Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FLUMICLORAC PENTIL

Nomenclatura Química:
Pentil-2-cloro-4 fluoro-5 [(3,4,5,6 tetrahidro) ftalimida] - fenoxiacetato o pentil [2-cloro-5-(1-ciclohexano-1,2-dicarboximida) -4-fluorofenoxi]acético.
Clasificación Química: fenilftalimida.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	0,3 l/ha		Malezas de escaso desarrollo (2 - 4 hojas o 5 cm de altura).
	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*	0,3 l/ha (*)		Aplicar según desarrollo de la maleza: Chamico: de 3 - 5 hojas. Chinchilla: de 3 - 4 hojas. Malva cimarrona: de 2 - 4 hojas. Quinoa blanca: de 3 - 7 hojas. Verdolaga: de 6 - 8 hojas. Yuyo colorado: de 4 - 7 hojas. (*) En Mezcla de tanque con fomesafen o bentazon. En todos los casos, agregar un humectante no iónico a razón de 0,2%. Mezclar 0,3 l/ha de flumiclorac + 0,4 l/ha de fomesafen 25%, o 0,3% l/ha de flumiclorac + 0,5% l/ha de bentazon 60%, o 0,3 l/ha de flumiclorac + 0,625 l/ha de bentazon 48%.
	Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			

Información General:

Es un herbicida de contacto. En presencia del oxígeno y de luz, induce a la acumulación masiva de porfirinas. La acción fotosensible de éstas, origina la peroxidación de los lípidos de las membranas celulares ocasionando daños irreversibles en la estructura y función de los tejidos vegetales.
La soja lo degrada rápidamente y la selectividad se debe a un diferente metabolismo del cultivo con respecto a las malezas susceptibles.
La soja es tolerante desde el estado de una hoja trifoliolada, no obstante, flumiclorac puede producir transitoriamente un bronceado en algunas hojas presentes al momento de la aplicación. Después de dos semanas, el cultivo de soja se recupera y todas las nuevas hojas se desarrollan normalmente.

Es especialmente efectivo cuando al momento de la aplicación las malezas se encuentran en estado de plántulas (3 - 7 hojitas). En este estado el herbicida es absorbido por hojas, tallos y puntos de crecimiento. Las malezas quedan totalmente afectadas y no tienen posibilidad de recuperación. Además, dado que tienen un incipiente sistema radicular, tampoco pueden acumular reservas, ni pueden rebrotar.

Realizar la aplicación con suelo adecuadamente húmedo, con plántulas de malezas en activo crecimiento y con una humedad relativa superior al 60%.
Al ser un producto de contacto, hay que aplicarlo cuando ha completado la emergencia la mayoría de las malezas.
Aplicar un volumen de agua de 200 - 300 l/ha, una presión de 60 - 100 lb/pulg², tratando de lograr una buena cobertura de follaje. Siempre agregar un tensioactivo no iónico a razón de 200 cm3 cada 100 litros de caldo a pulverizar.
No aplicarlo solo ni en mezcla de tanque cuando la soja y las malezas están sufriendo un estrés por falta de lluvia, tampoco cuando al momento de la aplicación la humedad relativa es baja (40 - 50%).
No escardillar antes de la aplicación. Esperar que al menos transcurran 24 - 48 horas después de la aplicación para pasar el escardillo.
Período de carencia: debe respetarse su uso posicionado postemergente con la maleza al estado de 3 - 8 hojas.
Bajo estas circunstancias está exento de tiempo de carencia (TC).

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material absorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores cerrados e identificados y enviar para su disposición a sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) ó 14(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Principio activo:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

DL 50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata macho y hembra)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata macho y hembra)

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para abejas y aves y moderadamente tóxico para peces.
En caso de inhalación o ingestión, NO inducir el vómito. Llamar de inmediato al médico.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.