FLUROXIPIR

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS TOMAHAWK - AZBANY - AZBANY MAXX EXOCET - FANTOM FUSION - STARANE XTRA.

Nomenclatura Química:
fluroxipir: éster 1-metilheptil del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común Cebada Centeno Trigo	Apio cimarrón (*Ammi majus)* Biznaga (*Ammi visnaga)* Calabacilla (*Silene gallica)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol (*Helianthus annuus)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Senecio (*Senecio spp.)* Sunchillo (*Wedelia glauca)* Túpulo (*Sicyos polyacanthus)* Verónica (*Veronica persica)*	PC 28,80%: 0,35 a 0,6 l/ha (*) PC 28,8: 0,35 a 0,6 l/ha		En presencia de crucíferas, bolsa de pastor, mostacilla, mostaza, nabo, nabón, es necesario aplicar en mezcla con MCPA (SL al 28%) 1,0 a 1,5 l/ha o 2,4 D (EB al 100%) 0,30 a 0,45 l/ha. La dosis varía según el tamaño de la maleza. Es muy selectivo para el cultivo desde 3 hojas hasta hoja bandera visible. Aplicado en mezcla con MCPA o 2,4 D el período tolerante corresponde al de estos herbicidas: desde 3 a 5 hojas hasta la detección del primer nudo de encañe.
		PC 48%: 0,27 a 0,36 l/ha		En presencia de crucíferas, bolsa de pastor, mostacilla, mostaza, nabo, nabón, es necesario aplicar en mezcla con MCPA (SL al 28%) 1 a 1,5 l/ha o 2,4 D (EB al 100%) 0,30 a 0,45 l/ha. La dosis varía según el tamaño de la maleza. Es muy selectivo para el cultivo desde 3 hojas hasta hoja bandera visible. Dosis mínimas: con malezas pequeñas (2 a 4 hojas o en estado de roseta) creciendo activamente. Dosis máximas: con malezas de mayor tamaño o desarrollo, y si las condiciones ambientales son desfavorables (sequía). Para el control de senecio (Senecio spp.), enredadera anual (Polygonum convolvulus) y sanguinaria (Polygonum aviculare) utilizar en mezcla con 2,4-D ó MCPA según el estado fenológico del cultivo.
Cebolla		PC 28,8%: 1 l/ha		Para control de clavel amarillo o yuyo sapo (Wedelia glauca). Aplicar desde 3 - 4 hojas de la maleza hasta floración. Volumen: 200 - 300 litros de agua/ha.
		PC 48%: 0,60 l/ha (volumen: 200 - 300 litros de agua/ha) o 210 cm3/100 litros de agua		Para control de clavel amarillo o yuyo sapo (Wedelia glauca). Aplicar desde 3 - 4 hojas de la maleza hasta floración. Volumen: 200 - 300 litros de agua/ha.
Cítricos o citrus Frutales de pepita		PC 28,8%: 1 l/ha		Para control de clavel amarillo o yuyo sapo (Wedelia glauca), la pulverización debe dirigirse a la maleza, evitando que alcance hojas, frutos y tallos verdes de los frutales (ver Fitotoxicidad). Las malezas perennes deben tratarse entre inicio de floración y plena floración, cuando hay abundante follaje, para una mayor absorción y translocación del producto. Es conveniente efectuar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre húmedo después de un riego o lluvia.
		PC 48%: 0,60 l/ha (volumen: 250 - 300 litros de agua /ha) o 180 cm3/100 litros de agua		Para control de clavel amarillo o yuyo sapo (Wedelia glauca), la pulverización debe dirigirse a la maleza, evitando que alcance hojas, frutos y tallos verdes de los frutales (ver Fitotoxicidad). Las malezas perennes deben tratarse entre inicio de floración y plena floración, cuando hay abundante follaje, para una mayor absorción y translocación del producto. Es conveniente efectuar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre húmedo después de un riego o lluvia.

Barbecho químico	Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Enredadera perenne (*Convolvulus arvensis)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Malva blanca (*Sphaeralcea bonariensis)* Senecio (*Senecio spp.)* Soja guacha (*Glicyne max)* Trébol blanco (*Trifolium repens)* Trébol de los cuernos (*Lotus tennuis)* Trébol de olor (*Melilotus spp.)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Vicias (*Vicia spp.)* Yuyo sapo (*Wedelia glauca)*	PC 48%: 0,30 a 0,45 l/ha		Las dosis recomendadas para uso en barbecho químico deben ir siempre en mezcla con una dosis mínima de glifosato de 900 g de equiv.ácido/ha. (2,5 litros/ha de glifosato 48 % o 1,9 l/ha de glifosato 60,8 %). Para trébol blanco se recomienda el control durante el barbecho químico o en pre-siembra del trigo a dosis de 360 cm3/ha en mezcla con 3,0 l/ha de glifosato 48 % o 2,25 l/ha de glifosato 60,8 %. Para el control de soja guacha RG utilizar 360 cm3/ha y agregar además a la mezcla 300 cm3/ha de 2,4-D éster.
Caña de azúcar	Túpulo (*Sicyos polyacanthus)*	PC: 28,8%: 0,5 l/ha + 2,0 l/ha atrazina 50%	150	Para tratamiento post emergente. Se recomienda también como complemento del tratamiento de pre-emergencia con flumetsulam.
		PC 48%: 0,3 l/ha + 2,0 l/ha atrazina 50%		Para tratamiento post emergente. Se recomienda también como complemento del tratamiento de pre-emergencia con flumetsulam.

(*) Dosis recomendada para Adama Essentials Tomahawk

Información General:

Herbicida de penetración foliar sistémico, de acción hormonal.

Equipo y volúmenes de aplicación: en cultivo de cereales, pulverizadores de barra: 80-100 l/ha, equipo aéreo con volumen mayor de 8 l/ha.
En montes frutales, con equipo convencional de barra o portátil de manguera y lanza (aplicación dirigida); volumen de 250 a 300 l/ha.

Compatibilidad: en cereales es compatible en mezclas de tanque con herbicidas fenoxiderivados (2,4-D y MCPA) y graminicidas selectivos para el control de avena (Avena fatua).
En montes frutales con haloxifop para el control de malezas gramíneas perennes, como sorgo de Alepo y gramón, y anuales como sorgo de Alepo de semilla, pasto de cuaresma, capín y cola de zorro.

Forma de preparar las mezclas: si se usa con MCPA, disolver éste en primer término y luego hacer la emulsión con fluroxipir. Si se usa 2,4-D o graminicidas selectivos para trigo el orden es indistinto.

Restricciones de uso:
Intervalo entre aplicación en cereales y siembra de cultivos susceptibles; aplicado a la dosis y momento de aplicación recomendados, y bajo condiciones ambientales normales, pueden sembrarse en rotación cultivos susceptibles como soja a los 7 días, girasol y algodón a los 14 días, y maíz sin restricciones.
Intervalo entre aplicación y cosecha en cereales, frutales de pepita, citrus, cebolla : no presenta. Caña de azúcar: 150 días.

Fitotoxicidad:
Cereales y cebolla: no presenta.
Frutales en general: evitar pulverizar hojas, frutos y tallos verdes en plantas menores de 3 años, usar protectores para evitar el contacto con el tallo. En plantas de más de tres años no hay riesgos de fitotoxicidad si la pulverización se dirige a la base del tronco.

Importante: no aplicar cuando haya riesgo de deriva sobre plantas o cultivos susceptibles (algodón, frutales, girasol, hortalizas, ornamentales, papa, soja, etc) o sobre tierras preparadas para la siembra. Fluroxipir no es volátil, pero algunos de los herbicidas con los cuales se recomienda la mezcla, si lo son, debiéndose adoptar las precauciones necesarias para evitar la deriva.

Derrames:

Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores cerrados e identificados y enviar para su disposición final a sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Formulado éster líquido emulsionable: (48%)
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda CL 50: > 5,5 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante

Del formulado 28,8% (**)
Toxicidad oral aguda: DL50: >3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: >4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 5,16 mg/l

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del formulado 28,8% (***)
Toxicidad oral aguda: DL50: >2500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 1,66 mg/l

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante

Antídoto: no posee antídoto específico.

(**) ADAMA ESSENTIALS TOMAHAWK
(***) AZBANY

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar fuentes de agua.
Riesgos ambientales del producto formulado Azbany. Virtualmente no tóxico para abejas Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS TOMAHAWK	ADAMA ARGENTINA SA	33504	EC	28,8%	III
AZBANY	NUFARM S.A.	36617	EC	28,8%	III
AZBANY MAXX	NUFARM S.A.	38847	EC	48 %	III
EXOCET	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	38463	EC	28,8%	III
FANTOM FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40138	EC	48% (e.a. 33,3%)	IV
STARANE XTRA	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	35712	EC	48% (e.a. 33,3%)	IV