Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FLUSILAZOLE

Marcas comerciales: WINNER.

Nomenclatura Química:
flusilazole:bis (4-fluorofenil)-metil-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)-silano.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	150 cm3/ha	30	Iniciar los tratamientos al observar las primeras manchas. Hacer las aplicaciones subsiguientes a intervalos de 15 a 21 días. Repetir las aplicaciones en los intervalos más cortos indicados cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de las enfermedades, tales como elevada humedad ambiente, lluvias o rocío, y altas temperaturas.
Manzano	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	7,5 - 10 cm3 cada 100 litros de agua.	21	Iniciar los tratamientos en el estado de puntas verdes o botón rosado; repetir a caída de pétalos y en fruto en formación. Eventualmente puede repetirse una vez más, de existir condiciones predisponentes.
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	8 cm3/hl		Iniciar los tratamientos en el estado de puntas verdes, repitiendo la aplicación cada 10 a 12 días. Si existe Servicio de Alarma, aplicar hasta 96 horas de iniciado el período infectivo.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator (sin. oidium tuckeri))*	7.5 cm3 cada 100 litros de agua.	60	Iniciar los tratamientos cuando los brotes tengan de 10 a 15 cm de largo, repetir en floración, 20 días después de floración, y en cierre de racimo.

Información General:

Flusilazole es un fungicida sistémico, que penetra rápidamente en la planta y se traslada a todos sus órganos de manera progresiva y uniforme, con efectos preventivo y curativo. Su acción sobre el patógeno se ejerce inhibiendo la biosíntesis del ergosterol.

Equipo y técnica de aplicación
Puede ser aplicado con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, cuyos picos estén provistos de pastillas de cono hueco.
Para el cultivo de maní la aplicación se debe realizar con 200 l/ha de agua, trabajando a una presión de 80 a 100 lb/pulg2 (5,5 a 7 bar).
En el cultivo de manzano y vid, puede ser aplicado con cualquiera de los equipos pulverizadores utilizados habitualmente en fruticultura; el volumen de aplicación debe ajustarse de acuerdo al TRV, para lograr un buen mojado, hasta punto de goteo.

Compatibilidad
Flusilazole es compatible con los fungicidas e insecticidas actualmente en uso, pero no se recomienda emplearlo en mezclas de tanque hasta tanto se disponga de información específica para los cultivos recomendados.

Derrames:
Contener y absorber el líquido derramado con un inerte tal como aserrín, tierra o arena. Barrer, recoger con pala y almacenar en recipientes debidamente identificados, hasta su eliminación final (mediante incineración controlada en sitios especializados para tal fin, o remitir a empresas especializadas en el tratado de este tipo de productos).

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para las operaciones de carga del aplicador y aplicación del producto debe utilizarse el siguiente equipo: gorra y protector facial, camisa de mangas largas y pantalones largos, botas y guantes de goma.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda(rata): DL 50: 1696 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(conejo): DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria(rata): CL 50: > 4,9 mg/kg

Irritación cutánea: No irritante
Irritación ocular: No irritante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
WINNER	DUPONT	30527	EC	40%	II