Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FLUSILAZOLE + CARBENDAZIM

Marcas comerciales: FUSION.

Nomenclatura Química:
flusilazole: bis (4-fluorofenil)-metil-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)-silano
carbendazim: metil bencimidazol-2-ilcarbamato
Clasificación Química: triazol + bencimidazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	0,5 a 0,6 l/ha	30	Iniciar los tratamientos al observar las primeras manchas. Reaplicar a intervalos de 15 a 21 días. Repetir las aplicaciones en los intervalos más cortos indicados cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de las enfermedades, tales como elevada humedad ambiente, lluvias, rocío y altas temperaturas.
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón de la hoja (*Septoria glycines)* Tizón de la vaina y del tallo (*Phomopsis spp.)* Tizón de la vaina y del tallo (*Diaporthe spp.)*	0,7 - 0,8 l/ha	35	Realizar una primera aplicación en estado fenológico R3, repitiendo a los 15 - 21 días, de acuerdo a la presencia de enfermedades y condiciones climáticas.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar a partir de plena floración (estado fenológico R2) o cuando se detecten los primeros síntomas (pústulas). Esto es con 3% de incidencia (3 folíolos con al menos una pústula cada 100 folíolos muestreados). Si persisten las condiciones favorables para la enfermedad (temperaturas entre 11 °C - 28 °C y un mínimo de 6 horas de rocío), repetir la aplicación a los 15 - 21 días aproximadamente.
Trigo	Golpe blanco (*Fusarium graminearum)* Mancha de la gluma y del nudo (*Septoria nodorum)*	0,75 a 1 l/ha (*)		La aplicación debe ser preventiva, al comienzo de la floración del cultivo, cuando los primeros estambres se ven fuera de las espiguillas. Repetir a los 15 - 20 días, de persistir condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la enfermedad.
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici)* Roya negra del trigo (*Puccinia graminis f. sp. tritici)* Septoriosis (*Septoria nodorum)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*			Aplicar durante el período que va desde la aparición del segundo nudo (principio de encañazón) hasta hoja bandera completamente desplegada (última hoja que se despliega); durante ese período aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas (pústulas, manchas o puntos negros) o tan pronto como las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de estas enfermedades. Dentro del período señalado es muy importante proteger la hoja bandera y la inmediata inferior, dada la importancia de las mismas en el llenado de granos y definición de rendimiento.

(*) Utilizar las dosis mayores en aquellas variedades caracterizadas como susceptibles, según calificación de cultivares o información zonal o regional de variedades del INTA.

Información General:

Fungicida sistémico de uso agrícola, de acción preventiva y curativa post-infectiva (en las primeras fases luego de la infección) para el control de enfermedades en soja, trigo y maní. Combina la acción de dos principios activos, flusilazole y carbendazim, los cuales en conjunto poseen efecto preventivo, porque inhibe la germinación de esporas, y efecto curativo porque inhibe el crecimiento micelial y esporulación de los hongos causantes de estas enfermedades.

Preparación
El producto está formulado como una suspensión concentrada.
Para su preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:
1- Asegurar que el equipo esté perfectamente limpio.
2- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia y filtrada, hasta un tercio de su capacidad; poner el agitador o el retorno en funcionamiento.
3- Incorporar lentamente la cantidad necesaria de producto, según la dosis a aplicar y la superficie a tratar.
4- Completar la carga de agua del tanque, y mantener el agitador o el retorno en funcionamiento hasta lograr un caldo homogéneo.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado con equipos terrestres, de arrastre o autopropulsados, o equipos aéreos.
En aplicaciones terrestres se deben utilizar caudales no inferiores a 200 l/ha de agua, trabajando con una presión de 80-100 lb/pulg2 (5,5-7 bar).
Antes de aplicar es necesaria la calibración del equipo con agua, a velocidad y presión constante, en un terreno de iguales características al sitio de aplicación.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible. Los picos más aptos a tal fin son los de cono hueco, que producen gotas de entre 100 y 250 micrones.
Con equipos aéreos utilizar un caudal no menor de 30-40 l/ha, calibrando el equipo para asperjar entre 30 40 gotas/cm2. No exceder nunca el ancho efectivo de trabajo de la aeronave.

Advertencias
NO debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés, producto de sequías, bajas temperaturas, ataque de insectos, deficiencias minerales, etc.
NO debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las tres horas luego de la aplicación.
Es compatible con la mayoría de los compuestos fitosanitarios excepto los de reacción alcalina como el caldo bordelés y polisulfuro de calcio.
NO aplicar el producto en mezcla con ningún otro producto sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Derrames:
Producto sin preparar o caldo de pulverización: mantener alejados a personas y animales. No fumar. Contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado. En ambos casos colocar el material recogido en tambores rotulados, cubrirlo totalmente con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua) y llevar a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 1 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para la operaciones de carga del aplicador y aplicación del producto deben utilizarse el siguiente equipo: gorra y protector facial, camisa de mangas largas y pantalones largos, botas de neoprene y guantes con barreras laminadas, de goma de nitrilo o butilo.

Información Toxicológica:

Información del producto formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria:	Producto poco peligroso
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización cutánea:	No es sensibilizante alérgico

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

En todos los casos debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 5 metros sobre las riberas de cuerpos de agua naturales o artificiales que conecten con éstos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FUSION	DUPONT	33718	SC	12,5% + 25%	II