FLUTRIAFOL

Marcas comerciales: IMPACT 12,5 - TRECKER - VINCIT 5.

Nomenclatura Química:
flutriafol: alcohol (RS)-2,4'-difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-il metil) bencidrilo
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Carbón cubierto (*Ustilago hordei)* Carbón desnudo de la cebada (*Ustilago nuda hordei)* Tizón de las plántulas de cebada (*Gibberella zeae)*	PC 5%: 75 cm3/qm		Puede aplicarse hasta un año antes de la siembra sin afectar el poder germinativo de la semilla, ni la eficacia del producto.
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón desnudo del trigo (*Ustilago nuda tritici)* Golpe blanco del trigo (*Giberella zeae)*			Puede aplicarse hasta un año antes de la siembra sin afectar el poder germinativo de la semilla, ni la eficacia del producto. Cuando un análisis previo determine menos del 4% de embriones afectados con carbón desnudo se puede emplear 65 cm3/qm de flutriafol.

Información General:

Fungicida sistémico para tratamiento de semillas, con acción erradicante y de protección en trigo y cebada que contiene 50 g de flutriafol por litro.
Se absorbe en el momento de germinación de la semilla y se traslada dentro de la planta por el xilema efectuando un control interno y externo de las enfermedades. Tiene actividad preventiva y erradicante, inhibiendo la síntesis del ergosterol.
Aplicación: es importante conseguir una cobertura uniforme de las semillas, para lo cual se debe usar un cilindro o tambor rotativo excéntrico. Se llenan las 2/3 partes del mismo con las semillas a tratar, luego se agrega la dosis recomendada del fungicida diluida en 1 a 2 litros de agua por cada 100 kilos de semilla. Se tapa y se hace girar durante 5-10 minutos.

Restricciones de uso: la semilla que ha sido tratada debe ser usada exclusivamente para siembra, nunca utilizarla para alimentación humana o animal, ni tampoco destinarla a la industria. Tratar solamente la semilla a sembrar, evitando que queden sobrantes de semillas tratadas.

Compatibilidad: en caso de ser necesario aplicar este fungicida simultáneamente con otro producto fitosanitario, consultar al servicio técnico de la empresa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía del maní (*Mycosphaerella berkeleyi)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	PC 12,5%: 0,5 l/ha	35	Iniciar los tratamientos al observar las primeras manchas. Repetir los tratamientos cada 15 a 21 días, correspondiendo el intervalo más corto a condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, sea, alta humedad ambiente, abundante rocío y elevada temperatura.
Manzano	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	PC 12,5%: 20 - 25 cm3/hl	30	1º tratamiento: en estadio fenológico botón rosado 2º tratamiento: en estadio fenológico: caída de pétalos 3º tratamiento: a 10-15 días de la caída de pétalos.
Papa	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	PC 12,5%: 0,75 - 1,0 l/ha	35	Inmediatamente observados los primeros síntomas. Repetir cada 10 a 15 días.
Peral	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	PC 12,5%: 20 - 25 cm3/hl	10	1º tratamiento: en estadio fenológico de prefloración 2º tratamiento: en estadio fenológico de caída de pétalos 3º tratamiento: a 12 días de la caída de pétalos.
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Oídio (*Microsphaera diffusa)*	PC 12,5%: 0,125 l/ha + 0,5 l/ha de carbendazim 50%		Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) o con la aparición de los primeros síntomas. Repetir 20 días después, según el desarrollo de la enfermedad.

	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	PC 12,5%: 0,4 - 0,6 l/ha	35	Realizar la aplicación en forma preventiva antes de la aparición de la enfermedad o en forma curativa cuando la infección es menor al 5%; la dosis mayor debe ser aplicada en controles curativos cuando la infección se encuentra entre los siguientes parámetros: por arriba del 5% y por debajo del 15%.
Trigo	Golpe blanco del trigo (*Giberella zeae)*	PC 12,5%: 1,0 l/ha		Iniciar los tratamientos en prefloración, cuando aparee la enfermedad, para evitar el daño en la hoja bandera y glumas de la espiga. Si fuera necesario repetir los tratamientos al comenzar la formación del grano.
	Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici)*			Iniciar los tratamientos al observar las primeras pústulas.
Vid	Oidio de la vid *(Oidium tuckeri)*	PC 12,5%: 40 cm3/hl	53	1° aplicación: 10-15 cm de brote 2° aplicación: A Floración 3° aplicación: Grano Pimienta 4° aplicación: 20 días de la 3° aplicación.

Información General:

Flutriafol es un fungicida sistémico de amplio espectro de control, principalmente activo contra hongos Basidiomicetes y Ascomicetes. Penetra en las hojas y se traslada en forma acrópeta por el xilema. Detiene la producción de ergosterol, la membrana celular colapsa y se destruye el hongo.
Posee propiedades erradicantes y protectoras y tiene una activa acción de vapor especialmente contra oídios. La protección dura de 4 a 6 semanas pero puede ser aún mayor.
También se absorbe en el momento de la germinación de la semilla tratada y se traslada dentro de la planta por xilema efectuando un control temprano interno y externo de enfermedades. Tiene actividad preventiva y erradicante, inhibiendo la síntesis de ergosterol.
Aplicación: puede aplicarse con equipos terrestres y también por avión.
Aplicación terrestre: emplear como mínimo 200 l/ha de agua. Los equipos de alta presión aseguran una mejor penetración y mojado en el cultivo.
Aplicación aérea: emplear como mínimo 20 l/ha de agua.

Compatibilidad: flutriafol es compatible con la mayoría de los insecticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes comúnmente usados en el cultivo de trigo, maní y papa.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.
Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma. No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel, y boca. Este producto sin diluir puede dañar los ojos.
No destapar picos o boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 5%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 0,19 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Toxicidad del formulado 12,5% SC
Toxicidad oral aguda: DL50:> 3000 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata): DL50:> 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 2,03 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante

En caso de ingestión: NO provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. NO dar a beber leche, aceite, ni sustancia grasa alguna.

Proporcionar atención médica de inmediato.
Antídoto: suministrar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión dar papilla de carbón activado y purgante salino, no oleoso (sulfato de sodio: 30 g). El lavado gástrico es eficaz si se hace antes de las 4 horas de ingerido el producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
IMPACT 12,5	FMC	34296	SC	12,5%	III
TRECKER	FMC	34894	SC	12,5%	III
VINCIT 5	FMC	34426	FS	5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.