FLUXOFENIM

Marcas comerciales: CONCEP III.

Nomenclatura Química:
fluxofenim: 1-(4- clorofenil) - 2,2,2- trifluoro -0-(1,3- dioxolan - 2 - ilmetil) - etanona - oxima
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: metiloxima.
Acción: protección.

Uso: antídoto de herbicida.

Información General:

Antídoto de herbicida que debe utilizarse como terápico de semilla para proteger al sorgo del efecto fitotóxico cuando se emplean herbicidas a base de S-metolacloro. No posee acción herbicida por sí mismo.
No protege al sorgo del efecto de otros componentes de herbicidas incluyendo las triazinas. Dosis altas de triazinas pueden afectar al cultivo de sorgo dependiendo del tipo de suelo y de las precipitaciones. Este producto ha demostrado ser seguro y efectivo tanto en sorgo granífero como forrajero.

Preparación: debe ser aplicado sobre las semillas de sorgo en forma de dilución. La dilución se prepara agregando al producto agua limpia en cantidad necesaria hasta alcanzar el volumen de dilución (agua + producto), recomendado para cada tipo de semilla. Para la mayoría de los equipos para tratamiento de semillas se recomienda usar un volumen de dilución de 500-750 cm3/100 kg de semilla. En caso de aplicación simultánea debe mezclarse con curasemillas coloreados. En caso de aplicación sobre semilla no tratada previamente con curasemillas coloreados, se debe agregar un colorante para tratamiento de semillas. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada. Usar siempre agua limpia. No es necesario utilizar adherentes.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto viene formulado como concentrado emulsionable en agua, para ser aplicado sobre las semillas de sorgo. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo. También puede utilizarse tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera o máquina mezcladora con sinfín.
NO aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada con este producto, debido a que la misma fluirá más lentamente.
Este producto debe aplicarse junto a un colorante para tratamiento de semillas, o bien mezclarse con curasemillas coloreados. Puede usarse en semillas que hayan sido previamente tratadas con curasemillas coloreados.

Preparación en equipo de tratamiento industrial: las mezclas deben hacerse en recipientes que tengan agitación.
- Si el producto va a ser aplicado solo: llenar el tanque de la mezcladora con la mitad del agua necesaria, agitar y agregar la cantidad de colorante que sea necesario. Luego adicionar lentamente la cantidad de producto de acuerdo con la dosis recomendada. En caso de usar adherente, añadirlo lentamente y finalmente enrasar con agua hasta el volumen indicado.
- Si el producto será utilizado en mezcla con un fungicida/insecticida: llenar el tanque de la mezcladora con la mitad del agua necesaria, agitar y agregar la cantidad de fungicida/insecticida que sea necesario y mezclar hasta obtener un suave empastado (slurry). Finalmente agregar la cantidad de antídoto de acuerdo a la dosis recomendada y enrasar con agua hasta el volumen indicado.

Preparación en hormigonera: el interior de la máquina debe ser humedecido previo al tratamiento, con alrededor de 250 cm3 de solución. Cargar la semilla dentro de la hormigonera y distribuir uniformemente sobre ellas la solución de antídoto durante la rotación. Continuar rotando alrededor de dos minutos hasta que toda la semilla esté uniformemente tratada. En caso que el tratamiento no quedara uniforme, se deberá continuar con la rotación hasta obtener uniformidad.

Preparación en tambor excéntrico: en caso de no disponer de una hormigonera, se puede utilizar un tambor excéntrico. El interior del tambor debe ser humedecido previo al tratamiento, con alrededor de 250 cm3 de solución. Cargar la semilla dentro del tambor y distribuir uniformemente sobre ellas la solución de antídoto durante la rotación. Continuar rotando alrededor de tres minutos, hasta que toda la semilla esté uniformemente tratada. En caso que el tratamiento no quedara uniforme luego de tres minutos, se deberá continuar con la rotación hasta obtener uniformidad.

Restricciones de uso:
Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

El antídoto fluxofenim protege exclusivamente a la semilla de sorgo de la acción de herbicidas a base de S-metolacloro. Este antídoto puede usarse en semillas de sorgo que hayan sido previamente tratadas con curasemillas coloreados.
NO debe repetirse el tratamiento sobre semilla ya tratada con fluxofenim.
La semilla tratada no debe destinarse al consumo humano ni a la alimentación animal. Debe destinarse exclusivamente para la siembra.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas, la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: puede ser mezclado con curasemillas para sorgo.
NO mezclar con formulaciones que contengan solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de sorgo, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete. Debe ser aplicado únicamente a semillas de alta calidad para asegurar una buena germinación y protección. El fluxofenim puede reducir el poder germinativo si es usado en semillas de baja calidad. La acción protectora no depende de la temperatura adecuada para el crecimiento del sorgo ni de las condiciones de humedad del suelo, sin embargo, el S-metolacloro es más activo en suelos húmedos que en suelos secos. En consecuencia, en suelos con excesiva humedad, puede haber una leve y temporaria fitotoxicidad del S-metolacloro que afecte a los híbridos de sorgo tratados con este producto.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar, beber ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección, puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: = 943 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2020 mg/kg (conejo)
LC50: >4,190 mg/m3

Advertencias para el médico:
Moderado irritante dermal. Ligero irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Muy tóxico para organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 1 metro entre el área a sembrar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de aplicación y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CONCEP III	SYNGENTA AGRO	33235	EC	96%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.