FOLCISTEINA

Marcas comerciales: AGROSTIM.

Nomenclatura Química:
folcisteina: compuesto de 98% de ácido N-acetil tiazolidin-4-carboxílico y 2% de ácido pteroylglutámico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: L-cisteína + ácido fólico.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	40 - 50 cm3/100 l agua		3 tratamientos. 1º) a los 100 - 120 días de germinación, 2º) y 3º) cada 20 - 30 días. Agregar tensioactivo.
Arroz	400 - 500 cm3/ha		Aplicar durante el macollaje con suficiente caudal de agua o dispersión acuosa de herbicida. Para favorecer el desarrollo inicial, puede tratarse la semilla necesaria para 1 hectárea con 100 cm3 diluidos en agua (1 - 2 litros por quintal de semilla).
Arveja o alverja	200 - 300 cm3/ha		Diluir la dosis en cantidad suficiente de agua (0,5 - 1 lt) e impregnar la semilla necesaria para 1 hectárea.
Césped	5 - 10 cm3/100 m2		3 - 4 tratamientos, espaciados cada 15 días, a partir de la emergencia.
Cítricos o citrus	25 cm3/100 l agua		3 tratamientos. 1º) en prefloración, 2º) con frutos de 2-3 cm 3º) al inicio de la forma de color.
Florales Flores Ornamentales	200 - 250 cm3/100 l agua (pulverización) o bien 5 - 10 cm3/10 l de agua con regadera		Al inicio del desarrollo vegetativo, repitiendo regularmente cada 15 días. Almácigos (para superar stress de trasplante efectuar 2 - 3 tratamientos, cada 7 - 10 días).
Frutales de pepita	20 - 25 cm3/100 l agua		3 tratamientos. 1º) en prefloración, 2º) después del cuaje y 3º) después del raleo de frutos.
Frutilla	40 - 50 cm3/100 l agua		3 tratamientos. Separados 10 - 15 días entre sí, desde el inicio y hasta el final de la floración.
Lechuga	250 - 300 cm3/100 l agua		Tratamientos: 1º) sobre plantas de 10 cm (aprox. 60 días de la siembra) y 2º) 15 días después. Para favorecer el desarrollo inicial, tratar la semilla para ha con 100 - 150 cm3 diluidos en agua.
Maíz Sorgo	400 - 500 cm3/ha		Diluir la dosis en cantidad suficiente de agua (200 - 300 cm3) e impregnar la semilla necesaria para 1hectárea.
Papa	30 - 40 cm3/100 l agua		3 tratamientos. Iniciar luego de la 5a o 6a hoja, continuando cada 15 - 20 días. En variedades precoces acortar los intervalos, de manera que el último tratamiento sea efectuado por lo menos 15 días antes de la cosecha.
Pimiento Tomate	60 - 80 cm3/100 l agua		3 tratamientos. iniciar el comienzo de la floración, repitiendo cada 10 - 15 días.
Poroto (chaucha)	50 - 60 cm3/100 l agua		3 tratamientos, iniciar el comienzo de la floración, repitiendo cada 10 -15 días.
Soja	100 - 200 cm3/ha		2 tratamientos, separados 15 - 20 días entre sí, a partir de la aparición de la tercera hoja. Para favorecer el desarrollo inicial tratar la semilla para una hectárea con 200 cm2, diluidos en 0,5 - 1 litros de agua
Vid	25 - 30 cm3/100 l agua		3 tratamientos. 1º) en prefloración, 2º) después del cuaje y 3º) antes del envero

Información General:

La folcisteína es un compuesto que una vez que penetra y se difunde en los tejidos de la planta, provee una prolongada liberación de grupos tiólicos (-SH) altamente reactivos, que inciden directamente en la actividad de las enzimas, actuando como un ordenador del metabolismo vegetal. Intervienen en su composición química un aminoácido derivado de la L-cisteína y una vitamina.
Empleado según prescripciones, valoriza las reservas bioquímicas y fisiológicas de los vegetales, permitiendo el logro de cosechas superiores en cantidad y calidad. La función de Agrostim® es estimular los procesos normales, vitales en las plantas. Estas responden a la aplicación desarrollándose más y mejor, soportando más fácilmente los períodos adversos y produciendo finalmente cosechas más abundantes y/o de mejor calidad.
Agrostim® no sustituye a los fertilizantes, pero hace que las plantas aprovechen mejor los nutrientes disponibles.

Equipos y técnicas de aplicación: la dosis elegida se diluye en agua y se aplica con cualquier tipo de aparato pulverizador. La elección del equipo y caudal deben relacionarse con el cultivo y condiciones ambientales.

Compatibilidad: compatible con insecticidas, fungicidas y herbicidas, siempre que no sean de reacción alcalina.

Restricciones de uso: no tiene.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena u otro material inerte y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición según legislación local vigente.

Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante su manipulación y aplicación no se requiere el uso de ropa protectora especial, sin embargo, en el caso de mezclarse con algún otro fitosanitario, se recomienda, durante la preparación y aplicación, usar ropa protectora adecuada, protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.
Evitar su ingestión, contacto con los ojos, inhalación, como así también la contaminación de alimentos. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. No destapar picos y boquillas con la boca. Higienizarse muy bien una vez utilizado el producto. No pulverizar contra el viento. Realizar un correcto lavado de las maquinarias.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 9620 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Primeros auxilios: este producto no puede causar intoxicaciones. Si durante su aplicación se produce algún accidente, averiguar si se usó mezclado con algún agroquímico y/u otro tipo de producto.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves y peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
AGROSTIM	FMC	31893	SL	5,10%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.