Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

COMPUESTO FOLIAR 11 - 8 - 6

Nomenclatura Química:
Compuesto de N, P, K y microelementos.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes.

Uso: fertilizante (foliar).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Alfalfa	2 l/ha	La primera aplicación al cierre del cultivo. Repetir a los 15 días después de cada corte. Número de aplicaciones: de 2 a 4.
Algodón		La primera aplicación antes de la floración. La segunda aplicación 15 días después de la floración. Número de aplicaciones: 2.
Banano o plátano	2 a 5 l/ha (0,3 %)	Aplicar a mediados del período vegetativo, repitiendo luego a los 30 días. Número de aplicaciones: 2.
Batata o boniato	2 l/ha	La primera aplicación después de plantar o de la salida del brote. Repetir cada 30 a 40 días. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Caña de azúcar	2 - 5 l/ha (0,3 %)	La primera aplicación realizarla cuando el cultivo tiene 50 cm de altura. Repetir cada 30 a 40 días. Número de aplicaciones: 2 - 3.
Cereales	2 l/ha	La primera aplicación durante el macollaje. La segunda aplicación al inicio del encañado o de la salida de la hoja bandera. Número de aplicaciones: 2.
Cítricos o citrus	2 a 4 l/ha (0,3 %)	La primera aplicación realizarla durante la formación del botón floral (no aplicar en floración). La segunda aplicación después de la caída de los pétalos y repetir durante la formación del fruto con intervalos de 15 a 30 días. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Frutales		La primera aplicación después de la brotación de las hojas. La segunda aplicación después de la floración o cuajado de los frutos. Repetir luego cada 15 a 30 días. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Frutilla	2 l/ha	La primera aplicación a los 60 días después del trasplante. Repetir cada 20 días y hasta antes de la floración. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Girasol		La primera aplicación cuando la planta tiene 8 hojas y la segunda aplicación después de 15 a 30 días y finalmente la tercera antes de la floración. Número de aplicaciones: 2 - 3.
Hortalizas		Hortalizas de hoja: la primera aplicación a las 4 semanas después de la siembra o a los 15 días después del trasplante. Repetir cada 10 - 15 días. Otras hortalizas: la primera aplicación durante la formación del botón floral. Repetir cada 15 días. Número de aplicaciones: 3 - 5.
Maní Soja		La primera aplicación antes de la floración. La segunda aplicación 15 días después de la floración. Número de aplicaciones: 2.
Ornamentales	0,2 %	La primera aplicación después del rebrote ó 10 días después de la siembra. Repetir cada 15 a 30 días. Número de aplicaciones: 2 - 10.
Papa	2 l/ha	La primera aplicación después de plantar o de la salida del brote. Repetir cada 30 - 40 días. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Tabaco		La primera aplicación a los 20 días después del trasplante. Repetir cada 15 días. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Té	2 a 4 l/ha (0,3 %)	La primera aplicación al inicio del rebrote de las hojas y repetir después de cada recolección. Número de aplicaciones: 2 - 4.
Yerba mate		La primera aplicación al inicio de la brotación. Repetir cada 30 días. Número de aplicaciones: 2 - 5.

Información General:

Composición:
Nitrógeno: 11%
Fósforo: 8%
Potasio: 6%
Azufre, calcio, Cobre, Magnesio, Manganeso, Hierro.

Grado: 11 - 3,5 - 5 Grado Equivalente: 11 - 8 - 6

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Este producto es un fertilizante foliar que estimula e incrementa el crecimiento de las plantas. La fertilización foliar es una aplicación complementaria, y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común al suelo.
Su acción se realiza a través de las hojas, permitiendo mejorar las condiciones generales en que la planta se desarrolla, al mismo tiempo que complementa el aporte de nutrientes principales en suelos pobres.
Por su extraordinaria fitocompatibilidad, resulta especialmente indicado para su aplicación en cultivos de hortalizas, frutales, cultivos extensivos y plantas ornamentales.

Compatibilidad:
- Compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y herbicidas, por lo que permite su aplicación conjuntamente con los distintos tratamientos fitosanitarios.
- No es compatible con productos de reacción alcalina.

Precauciones:
No pulverizar plantas en plena floración.

Derrames:
Absorber el derrame con material adecuado (arena, aserrín) y colocarlo en un recipiente adecuado para su disposición final recurrir a empresas especializadas habilitadas localmente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico para abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.