FOLPET

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS SUPERFOLPAN.

Nomenclatura Química:
folpet: N-(triclorometiltio)ftalimida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ftalimida.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo Cebolla	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	150 - 160 g/hl	7	Tratamientos preventivos cada 10 - 15 días.
Almácigos	Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*	20 g/m2		
Almendro Ciruelo	Podredumbre morena de los frutales (*Monilia cinerea)*	125 g/hl		Primera aplicación: antes de la floración. Segunda aplicación: a la caída de los pétalos. Tercera aplicación: 20 días antes de la maduración de los frutos.
Apio	Viruela del apio (*Cercospora apii)*	160 g/hl		Tratamientos preventivos en el almácigo y en cultivo, cada 10 - 15 días acortando a 7 días cuando las condiciones de ambiente favorezcan la enfermedad.
Cerezo Duraznero	Podredumbre morena de los frutales (*Monilia cinerea)*	125 g/hl		Primera aplicación: antes de la floración. Segunda aplicación: a la caída de los pétalos. Tercera aplicación: 20 días antes de la maduración de los frutos.
	Sarna de los frutales de carozo (*Fusicladium carpophilum)*			Desde la caída de los pétalos; después cada 15 días.
Frutilla	Podredumbres (*Botrytis spp.)* Viruela de la frutilla (*Ramularia tulasnei)*	160 g/hl		Dos o tres aplicaciones con intervalos de un semana, durante la floración, con equipo de alto volumen y dispositivo de 3 picos por planta. Volumen mínimo 800 l/ha.
Hortensias	Viruela de la hortensia (*Phyllosticta hydrangeae)*	115 g/hl		Tratamientos preventivos cada 15 días desde la aparición de las primeras hojas.
Lirios	Mancha parda del lirio (*Heterosporium gracile)*			Tratamientos preventivos desde brotación, repetidos cada 15 días.
Manzano Membrillero	Podredumbre amarga de la manzana (*Colletotrichum gloeosporioides)* Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	150 g/hl	10	Aplicar a yema hinchada, puntas verdes, puntas rosadas, caída de pétalos y luego cada 15 días.
	Podredumbre morena de los frutales (*Monilia cinerea)*	125 g/hl		Primera aplicación: antes de la floración. Segunda aplicación: a la caída de los pétalos. Tercera aplicación: 20 días antes de la maduración de los frutos.
Melón Pepino Sandía Zapallo criollo	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	150 g/hl	7	Cada 20 días durante el período vegetativo.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,5 - 2,275 kg/ha		Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma.
		150 - 230 g/hl		Iniciar con plantas de 10 cm de altura, aumentando la dosis según el desarrollo del cultivo.
	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*			Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma.
Peral	Antracnosis del peral y del manzano (*Sphaceloma pirinum)* Sarna del peral (*Venturia pirina)*	150 g/hl	10	Aplicar a yema hinchada, puntas verdes, puntas rosadas, caída de pétalos y luego cada 15 días.
Pimiento	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	160 g/hl	7	Tratamientos preventivos desde la aparición de las primeras hojas.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)*	150 g/hl	10	Tratamientos preventivos cada 10 - 15 días.
Rosales	Mancha negra del rosal (*Diplocarpon rosae)* Oídio del rosal (*Oidium leucoconium var. rosae)*	115 g/hl		Iniciar al reventar la yemas, repitiendo cada 15 días.

	Podredumbres (*Botrytis spp.)*			
Tomate	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	160 - 180 g/hl		Desde que las plantas son jóvenes, repetir cada 10 días.
	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*			Iniciar antes de la floración y repetir cada 10 días.
Vid	Antracnosis de la vid (*Sphaceloma ampelinum)* Peronóspora (*Plasmopara viticola)* Podredumbre negra de la vid (*Phoma uvicola)*	125 - 160 g/hl	20	Desde que los brotes tienen 8 a 10 cm de largo hasta 15 días antes de la cosecha, a intervalos de 20 días. Donde hubiera Servicios de Alarma seguir sus indicaciones.
	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*			Agregar 0,2% (200 gramos cada 100 litros) de azufre mojable. Donde hubiera Servicios de Alarma seguir sus indicaciones.
	Podredumbres (*Botrytis spp.)*			Al comienzo del envero, antes que cierre el racimo y luego cuando las condiciones climáticas lo requieran. Donde hubiera Servicios de Alarma seguir sus indicaciones.

Información General:

Fungicida protector. Tiene buena persistencia y una acción estimulante sobre la vegetación. Para el control de oídio de la vid agregar 0,2% de azufre mojable (200 g/100 litros).

Equipos de aplicación: máquinas pulverizadoras de alto y bajo volumen (atomizadoras), a turbina, etc.
Presión de trabajo: 300 a 400 libras por pulgada cuadrada (21 a 28 kg/cm2).
Volumen a utilizar: mínimo 600 l/ha en parrales; otros cultivos: caudal suficiente hasta punto de goteo.
Para espolvoreo: espolvoreadoras manuales o con motor.

Compatibilidad: para disminuir la aparición de líneas resistentes a los fungicidas curativos, se destaca el uso combinado con folpet.
Compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas en uso.
No compatible con aceite mineral y los tratamientos muy próximos a curas con aceite.
NO mezclar con productos emulsionables sin ensayar previamente que la mezcla sea estable y no fitotóxica.
NO mezclar con materiales o productos alcalinos como caldo bordelés y polisulfuro de calcio.

Inactivación: humedecer con soda cáustica al 10%.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin. Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): M4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 0,7 mg/litro

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante
El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Antídoto: no se conoce antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico
En las condiciones de uso no afecta la vida silvestre.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS SUPERFOLPAN	ADAMA ARGENTINA SA	31241	WP	80%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.