FORAMSULFURON + IODOSULFURON METIL SODIO

Marcas comerciales: EQUIP WG.

Nomenclatura Química:
foramsulfuron: N, N-dimetil -2-[3- (4,6- dimetoxipirimidin-2-il) ureidosulfonil] -4 formilaminobenzamida
iodosulfuron metil sodio: metil 4 iodo 2 [3 (4 metoxi-6-metil-1,3,5, triazin-2- il) ureidosulfurfonil] benzoato, sal sódica
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea + sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Abrojo chico (*Xanthium spinosum)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Chamico (*Datura ferox)*	120 g + 2000 g sulfato de amonio + 1600 cm3 de coadyuvante	20	Tamaño del maíz: 2 a 6 hojas Tamaño de maleza: 1 a 3 hojas
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Pasto bandera (*Brachiaria extensa)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Tamaño del maíz: 2 a 6 hojas Tamaño de maleza: 2 a 4 hojas
	Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)*			Tamaño del maíz: 2 a 6 hojas Tamaño de maleza: 2 a 5 cm.
	Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*			Tamaño del maíz: 2 a 6 hojas Tamaño de maleza: 2 a 6 hojas

Información General:

Es un herbicida post-emergente de acción sistémica para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz. Debe ser aplicado, cuando las malezas se encuentran en los primeros estadios de desarrollo y en activo crecimiento.

Tiene actividad residual que permite el control de algunas malezas de hoja ancha que germinen después del tratamiento.

Luego de aplicado, es absorbido a través de hojas y raíces, translocándose dentro de la maleza a las zonas en activa división celular, inhibiendo el crecimiento de las especies susceptibles.
Este producto, interrumpe el metabolismo de los aminoácidos en las malezas, inhibiendo la enzima ALS sintetasa. El primer síntoma observable es la decoloración y detención del crecimiento de las mismas, al cabo de 5 a 7 días, produciendo la muerte entre 2 y 3 semanas luego de la aplicación.
El control de malezas se ve favorecido con alta temperatura ambiente, alta humedad de suelo y activo crecimiento de las malezas y el cultivo.

Preparación: lavar cuidadosamente el equipo pulverizador antes de usarlo.
Seguir la siguiente secuencia, siempre con el agitador en marcha:
1) Llenar el depósito hasta la mitad con agua.
(En el siguiente orden)
2) Agregar al tanque de la pulverizadora, la cantidad total de sulfato de amonio para una tanqueada y equivalente a una dosis de 2 kg/ha.
3) Agregar la cantidad total de herbicida equivalente a una dosis de 100 - 120 g/ha y en último término.
4) la cantidad total de coadyuvante equivalente a 1,5 l/ha - 1,75 l/ha.
5) Terminar de llenar el depósito con agua y homogenizar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Es importante lograr un correcto mojado de las malezas, 30 a 40 gotas/cm2, con una distribución uniforme y una variación menor a 30%.

Parámetros de aplicación:
- Volumen del caldo: 100 a 140 l/ha.
- Presión de trabajo: 35 a 45 lb/pulg2.
- Tipo de pastillas: abanico plano.
- Ángulo de pastillas: 80º y 110º.

Momento de aplicación:
Maíz: aplicar cuando las malezas tengan un estado de desarrollo de 2 a 4 hojas, el cultivo se encuentre entre 2 y 6 hojas totalmente desplegadas y las condiciones ambientales sean favorables.

Compatibilidad: NO realizar mezclas de tanque con insecticidas organofosforados.

Restricciones de uso:
- Suspender las aplicaciones cuando el cultivo o las malezas presenten síntomas de estrés hídrico.
- No aplicar con temperaturas menores a 15ºC que limiten el metabolismo del cultivo.
- Aplicar sólo en aquellos materiales de maíz recomendados por Bayer S.A. - División Agrícola.
- No aplicar inmediatamente antes o después de riego o lluvias mayores a 40 mm. En esos casos esperar a que el contenido de agua en el suelo sea igual o inferior al 50% de la capacidad de campo. Dejar pasar 20 días entre la aplicación y la cosecha de grano. Dejar transcurrir 6 meses entre la aplicación y la posterior siembra de especies forrajeras. No sembrar especies forrajeras luego de una doble aplicación en maíz.
- Para el uso en canchas de golf, polo y todo tipo de césped deberán transcurrir 4 horas, luego de la aplicación para que no exista peligro de traslado en el calzado o máquinas a otros lugares donde pueda ser fitotóxico. No cortar ni regar, hasta que el follaje no esté completamente seco. No requiere riego luego de aplicado

Derrames:
En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL50 oral aguda: 5000 mg/kg.
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg.
CL50 inhalatoria aguda: 4690 mg/m3.

Ligeramente irritante dermal. Moderadamente irritante ocular.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces. Muy tóxico para algas. Para evitar contaminar cursos de agua naturales, ríos, lagunas o lagos dejar una distancia de 5 metros entre la zona tratada y el espejo de agua.
Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EQUIP WG	BAYER	33708	WG	30% + 2%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.