Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FORMETANATO CLORHIDRATO

Marcas comerciales: DICARZOL 50 PS.

Nomenclatura Química:
Carbamato de propil 3(dimetilamino) propil clorhidrato ó 3-dimetil aminometilenaminofenil metilcarbamato.
Clasificación Química: carbamato.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	Acaro de la yema (*Aceria sheldoni)*	15 - 20 g/hl (0,37 - 0,50 kg/ha)	7	Al inicio de primavera y otoño al aparecer los ácaros.
	Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)*	10 - 15 g/hl (0,25 - 0,37kg/ha)		Al observar la presencia de la plaga.
Florales Ornamentales	Arañuela de las flores (*Tetranychus urticae)* Trips de California (*Frankliniella occidentalis)* Trips de las flores (*Frankliniella rodeos)*	60 - 100 g/hl		Iniciar la aplicación al observar las primeras formas móviles y ni bien se notan los primeros ataques de ácaros y trips.
Manzano	Trips de California (*Frankliniella occidentalis)*	75 g/hl (1,5 kg/ha)	7	Plena floración con 1 - 2 trips por flor.
Pelón				Aplicar en floración y/o pre cosecha.
Pimiento Tomate		150 - 200 g/hl o 100 g + 1kg de azúcar (1,5 - 2 kg/ha o 1 kg + 10 kg de azúcar)	3	En transplante: con la presencia de un trips por planta. En cultivo implantado: aplicar al observar un trips por flor.

Información General:

Controla ácaros en estadios móviles (ninfas y adultos) por contacto o ingestión. Actúa por inhibición de la colinesterasa.

Técnica de aplicación:
Cítricos: aplicar con alto volumen (hasta punto de goteo) mojando bien los frutos, hojas y ramas con los agitadores en marcha. Preparar la cantidad necesaria a utilizar dentro de 4 horas.

Manzano y peral: aplicar con equipos de alto volumen (2000 - 3000 l/ha) y alta presión (400 - 430 lb/pulg2) a la dosis de 75 g/hl con un volumen mínimo de 2000 l/ha de caldo. A menor volumen ajustar la dosis (g/hl) para mantener la cantidad de producto por unidad de superficie (kg/ha).
Pimiento y tomate: el volumen mínimo a aplicar por hectárea es de 1000 l/ha de caldo. En el momento de la aplicación, determinar los umbrales de daño para evitar la infección de Peste negra, dado que el insecto es vector de la enfermedad. Los síntomas de ésta, se manifiestan a los 15 - 20 días posteriores a la aparición de los trips.

Compatibilidad: este producto es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de los de reacción alcalina (caldo bordelés, polisulfuro de calcio).

Derrames:
En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Ingrediente activo:
DL 50 oral aguda para ratas: 21 mg/kg.
DL 50 dermal aguda para ratas: > 5600 mg/kg.

Producto formulado:
DL 50 oral aguda para ratas: 51 mg/kg
DL 50 dermal aguda en rata: > 4000 mg/kg.

Antídoto: atropina.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Riesgos ambientales: moderadamente tóxico para abejas y aves. Muy tóxico para peces. Se degrada rápidamente en el agua y en el suelo por hidrólisis.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DICARZOL 50 PS	BROMETAN	31760	SP	50%	II