ACIDO GIBERELICO (GIBERELINA A3)

Nomenclatura Química:
ácido giberélico (GA3): ácido(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propeno[1,2-b]furan-4-carboxílico
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: giberelina.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador (10% SP - 40% SG).

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alcaucil	PC 10%: 50 g/hl PC 40%: 12,5 g/hl	(*)	PC10%: Durante marzo a junio pulverizar toda la planta. PC 40%: Para cultivos perennes: Realizar 1 - 3 aplicaciones en la fase inicial del brote. Para cultivos anuales: Realizar 1 - 4 aplicaciones a intervalos de 2 semanas, a partir de la cuarta hoja verdadera. Usar volumen de agua suficiente para asegurar el mojado de toda la planta (hojas, tallos y brotes).
Apio	PC 10%: 30 a 50 g/hl PC 40%: 7,5 - 12,5 g/hl		Primero: 2 meses antes de la cosecha. Segundo: 1 mes antes de la cosecha.
Cebada cervecera	Ver momento de aplicación.		Según los resultados finales que se requieran: Para PC 10%: 250 mg/tm ácido giberélico (GA3): cerveza liviana tipo europea 500 mg/tm ácido giberélico (GA3): cerveza tipo británica 1 g/tm ácido giberélico (GA3): malta para destilación Para PC 40%: 62,5 mg/tn ácido giberélico (GA3): Cerveza liviana tipo europea 125 mg/tn ácido giberélico (GA3): Cerveza tipo británica 250 mg/tn ácido giberélico (GA3): Malta para destilación
Cerezo	PC 10%: 10 a 15 g/hl PC 40%: 2,5 a 3,75 g/hl		Cuando el color del fruto está entre el verde claro y el pajizo, antes de que cambie al rojo. Aproximadamente 3 semanas antes de la cosecha.
Ciruelo	PC 10%: 50 g/hl PC 40%: 12,5 g/hl		3 a 4 semanas antes de la cosecha, aproximadamente 10 días después del endurecimiento de los carozos.
Clavel			Antes de la apertura de las yemas, repetir semanalmente.
Crisantemo			Antes de floración, efectuar 2 aplicaciones foliares con intervalo de 10 días.
Cyclamen	PC 10%: 10 a 20 g/hl PC 40%: 2,5 a 5 g/hl		Aplicar cuando los pimpollos tienen 2 a 3 cm de largo.
Espinaca	PC 10%: 25 g/hl PC 40%: 6,25 g/hl		Primera aplicación: con plantas de 3 a 4 hojas verdaderas. Segunda aplicación: 10 días después de la primer aplicación.
Frutilla	PC 10%: 50 g/hl PC 40%: 12,5 g/hl		Mojar totalmente la planta antes de la floración para producir la apertura de los ramilletes.
Lechuga	PC 10%: 25 g/hl PC 40%: 6,25 g/hl		1 o más aplicaciones, comenzando 60 días antes de la cosecha.
Limón	PC 10%: 10 g/hl PC 40%: 2,5 g/hl		Aplicar antes que la fruta cambie su color verde a amarillo(mayo-junio). Usar 5000 L/ha.
Lúpulo			Cuando la longitud de ramas es de 1,5 a 2,5 m.
Naranja	PC 10%: 10 a 20 g/hl PC 40%: 2,5 a 5 g/hl		Aplicación temprana: antes que la fruta comience a cambiar de color. Usar 4000 a 5000 l/ha. Aplicación tardía: después de que la fruta ha alcanzado su color comercial, aproximadamente un mes antes de la recolección.
Papa semilla	PC 10%: 1 g/hl (en papa cortada) PC 10%: 2 g/hl (en papa semilla) PC 40%: 250 mg/hl (papa cortada) PC 40%: 500 mg/hl (en papa semilla y semillón)		Antes de la plantación sumergir las papas semillas en la solución durante 15 minutos.
Peral	PC 10%: 20 g/hl PC 40%: 5 g/hl		Dentro de las 48 horas posteriores a la helada, mojando bien todo el árbol.
Perejil			Pulverizar después del primer corte.
Pomelo			Aplicar en abril - junio, utilizar 5000 l/ha.
Poroto alubia	PC 10%: 3 g/hl PC 40%: 750 mg/hl		A comienzos de floración, de 30 a 45 días después de nacido el poroto.

Tomate	PC 10%: 10 a 20 g/hl PC 40%: 2,5 a 5 g/hl		Desde la aparición de los ramilletes florales. Los resultados son variables según variedad y temperatura de la zona.
Vid	PC 10%: 10 g/hl PC 40%: 2,5 g/hl		Para uva con semilla. Cuando los racimos tienen 4 a 6 cm de largo.
	PC 10%: 15 g/hl PC 40%: 3,75 g/hl		Para uva para pasas. Aplicar en 80% de floración.
	PC 10%: 20 a 30 g/hl PC 40%: 5 a 7,5 g/hl		Para uva sin semilla. Aplicar al 50 - 80% de floración (Caliptra caída en los hombros).
	PC 10%: 20 g/hl PC 40%: 5 g/hl		Para uva sin semilla. Cuando los racimos tienen 7,5 a 13 cm de largo.
	PC 10%: 30 g/hl PC 40%: 7,5 g/hl		Para uva sin semilla. Aplicar dos semanas después de floración. Repetir a los 7 días.

(*) TC:
PC 10%: 20
PC 40%: Excento para todos los cultivos
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.

Información General:

Acción: se absorbe en los tejidos tratados. Promotor y regulador del crecimiento de las plantas. Inductor de floración. Aumenta el número de frutos. Ruptura de latencia en órganos vegetativos, etc. Es un producto hormonal que produce distintos efectos según la época y cultivo tratado.
Alcaucil: adelantamiento de la cosecha entre 4 y 5 semanas.
Apio: aumento de tamaño, pecíolos más tiernos y mayor rendimiento.
Citrus: retrasa la cosecha, mayor uniformidad y reduce pérdidas de frutas dañadas.
Espinaca: aumento de peso fresco y mejor presentación comercial.
Florales: aumenta tamaño de la flor y evita la rotura del cáliz en claveles; vástagos florales más largos y de mayor diámetro en crisantemos; precocidad y mejor calidad en florales en general.
Frutilla: aumento de rendimiento en calidad y cantidad y adelantamiento de cosecha.
Lechuga: activa el crecimiento con temperaturas bajas. Aumento de maduración.
Papa “semilla”: ruptura de la latencia y estimulación de la brotación.
Peral: induce la formación del fruto después de una helada.
Poroto: acortamiento del ciclo y mayor tamaño del grano.
Tomate: aumento del tamaño y calidad de los frutos.
Vid: alargamiento, raleo y mayor tamaño de los racimos. Acelera maduración y aumenta la calidad de la uva pasa.
Aplicación: el caldo de aplicación debe tener entre 5,5 y 7 de pH. No debe haber cloro libre en la solución. El caudal varía de acuerdo con el cultivo tratado.

Preparación: teniendo en cuenta la dosis para cada cultivo, llenar con agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del equipo pulverizador, luego agregue la cantidad necesaria de Progibb, completar el resto de agua necesaria hasta lograr la concentración recomendada en cada cultivo para 100 litros de agua. Use la solución dentro de 24 horas de preparada.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: con equipos de alto volumen pulverizar hasta inicio de goteo; en forma de una fina pulverización que asegure una cobertura uniforme. En caso de árboles frutales, la pulverización es dirigida a los frutos o centros de floración y fructificación.

Recomendaciones de uso: Las lluvias caídas dentro de las 10 horas siguientes a la aplicación pueden lavar al producto, por lo cual se aconseja no pulverizar en días con probabilidades de lluvias. Las soluciones de PROGIBB deben ser aplicadas el mismo día de su preparación.
Es conveniente combinar con un tensioativo.

Restricciones de uso: frutos y vegetales tratados están sujetos a una tolerancia de 0,15 ppm.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fertilizantes foliares habitualmente utilizados. No combinar con sustancias alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa y consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales vigentes.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 1.74 mg/l

Del producto formulado 10%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 6.2 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del producto formulado 40%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 2,26 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Los bioensayos a dosis extremas no producen síntomas tóxicos.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.