Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

IMAZAQUIN + GLIFOSATO

Nomenclatura Química:
Sal amónica del ácido 2-(4- iso- propil-4-metil-5-oxo-2- imidazolín-2-yl)-3 quinolein carboxilico (1)/sal ispropilamina del ácido N - (fosfonometil) glicina.
Clasificación Química: fosfonometilglicina + imidazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (preemergente/presiembra).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Abrojillo (*Xanthium strumarium)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Ataco (*Amaranthus lividus)* Ataco espinudo (*Amaranthus spinosus)* Bejuco (*Ipomoea nil)* Bejuco (*Ipomoea purpurea)* Bejuco (*Ipomoea rubriflora)* Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Escoba dura (*Malvastrum coromandelianum)* Farolito San Vicente (*Nicandra peruviana)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Sorgo de Alepo de rizoma (*) (*Sorghum halepense)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Sunchillo (*Wedelia glauca)* Verdolaga	6,6 l/ha	60	Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas en activo crecimiento, debiendo evitarse las aplicaciones en períodos de sequía o durante la ocurrencia de cualquier evento adverso que afecte el normal crecimiento de las malezas. Es necesario un período de 8 horas libres de lluvias luego de la aplicación para asegurar la acción postemergente de este producto. La acción residual preemergente de este producto requiere una lluvia que incorpore el producto al suelo dentro de los 10 - 15 días de la aplicación. Para asegurar una mejor acción residual es conveniente que, al momento de aplicación, las malezas que presentan roseta basal de hojas, como los cardos, nabo, nabón y mostacilla, no superen los 10 cm de diámetro. De esta manera se evita el efecto "paraguas" de dichas malezas y se asegura la óptima llegada del producto al suelo. Si se prolonga el período de sequía pueden producirse escapes de algunas malezas. Las malezas absorberán el producto por vía radicular luego de su germinación si el suelo se halla húmedo. Por lo tanto, luego de la aplicación deben existir condiciones adecuadas de humedad en el suelo durante un período mínimo de 2 - 3 semanas.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

	(*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*) (*Amaranthus hybridus)* Yuyo cubano (*Tithonia tubaeformis)*			

(*) Control parcial.

Información General:

Es un herbicida para ser utilizado en presiembra o preemergencia de soja de primera siembra (sembrada sobre un rastrojo de cultivo del año anterior), que controla malezas establecidas y provee control residual. Estas dos características lo hacen especialmente apropiado para situaciones de labranzas reducidas y/o conservacionistas, en las que controla antes de la siembra malezas ya emergidas y en proceso de germinación o emergencia. Se posibilita así, un desarrollo inicial del cultivo libre de competencia de malezas. Es posible que algunas malezas susceptibles emerjan, pero su crecimiento quedará detenido y posteriormente morirán, gracias a la acción residual del herbicida.

Este herbicida proveerá control residual de malezas en germinación; el control de malezas ya establecidas dependerá de la especie y el tamaño adquirido por aquellas. Si inmediatamente luego de la aplicación, se realiza una labor que incorpore superficialmente el producto, puede transcurrir un período más prolongado hasta la ocurrencia de la primera lluvia.

Es un herbicida de espectro total, selectivo en soja sólo en aplicaciones de presiembra o preemergencia del cultivo. No aplicar en emergencia/postemergencia del cultivo de soja.
Para cualquier condición de producción del cultivo (siembra directa o cualquier labranza), pero con importante cobertura, excesivo tamaño o baja susceptibilidad de malezas de hoja ancha, puede aplicarse en mezcla de tanque con 2,4 D. Esta combinación debe realizarse sólo en presiembra. Es importante destacar que la maleza a controlar debe presentar un área foliar suficiente para la correcta absorción del herbicida. En el caso de que la vegetación de malezas latifoliadas sea excesivamente densa, es conveniente aplicar el 2,4 D primero y luego este producto para evitar que la cobertura de las malezas impida la llegada del producto al suelo.
Para siembra directa, el control de las malezas durante el invierno con un barbecho químico, optimizará la actividad herbicida sobre malezas establecidas. Este tipo de práctica permitirá además preservar los niveles de humedad edáficos.

Ocasionalmente, bajo condiciones de tiempo muy húmedo y frío, puede producirse un acortamiento de los entrenudos del cultivo que desaparece con el desarrollo de la soja y no afecta el rendimiento.
Biotipos resistentes de ocurrencia natural en algunas de las malezas citadas pueden no ser efectivamente controladas por éste u otros productos cuyo modo de acción sea la inhibición de la enzima acetohidroxisintetasa (ALS/AHS) o la de la inhibición de la enzima EPSP sintetasa. Un biotipo de maleza es una planta de una composición genética levemente diferente, pero distintiva respecto a las demás plantas de la misma especie y que aparece naturalmente.

Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y, como otros con el mismo modo de acción, deberían ser aplicados secuencialmente en combinación con otros productos registrados con modos de acción diferentes.

Combinaciones con pendimetalin:
Con las mezclas de tanque con pendimetalin, además de malezas indicadas en el cuadro, se obtiene un mejor control de Pie de gallina (Eleusine indica), braquiaria (Braquiaria plantaginea) y yuyo colorado (Amaranthus quintensis).
La dosis a adicionar de pendimetalin es de 3 - 3,5 l/ha, siendo la menor para los suelos livianos.
Las combinaciones con pendimetalin siempre deben realizarse de 10 - 15 días antes de la siembra a los fines de evitar retrasos en la emergencia del cultivo.

En caso de realizarse una labor previa a la siembra y posterior a la aplicación de glifosato + imazaquin + pendimetalin, la labor deberá ser superficial (5cm) con una rastra de dientes inclinados hacia atrás, a una velocidad mínima de 8 - 10 km/h. Esta labor puede realizarse desde la aplicación hasta el momento inmediato antes de la siembra.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente(Ej. Tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) ó 2 (WSSA) + G (HRAC) ó 9 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

DL 50 oral en ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal en ratas: > 4000 mg/kg.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE