HALOSULFURON METIL

Marcas comerciales: SEMPRA.

Nomenclatura Química:
halosulfuron metil: metil 5{[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)amino] carbonilaminosfonil}-3-cloro-1-metil-1-h-pirzole-4-carboxilato ó metil 3-cloro-5-(4,6-dimetoxipirimidin-2 yicarbamoilsulfamoil) -1-metilpirazole-4-carboxilato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	Cebollín (*Cyperus rotundus)* Cyperus iria; Chufa salvaje (*Cyperus esculents)* Totorilla (*Cyperus ferax)*	100 g/ha		Aplicar pre-riego, cuando el cultivo de arroz tenga 4-5 hojas, y la maleza se encuentre en activo crecimiento, estado vegetativo temprano.
	Lagunilla (**) (*Alternanthera philoxeroides)* Porotillo (**) (*Aeschynomene indica y aschynomene denticulata)*			Aplicar pre-riego, cuando el cultivo de arroz tenga 4-5 hojas, y la maleza se encuentre en estado vegetativo temprano, altura 5-10 cm. (**) CONTROL PARCIAL
Maíz	Cebollín (*Cyperus rotundus)*	Post emergencia del Maíz: 100 - 150 g/ha (*)		Esperar la emergencia del cebollín y cuando este alcance 15 cm de altura, realizar la aplicación.. No existen restricciones en cuanto al estado vegetativo del cultivo.
Maíz RG/RR		Post emergencia del Maíz RG/RR: 30 - 50 g/ha + 1.3 kg/ha de glifosato 74,7% SG o 2.5 L/ha de Glifosato 48% SL.		Post-emergencia de maíz: Esperar la emergencia del cebollín y cuando este alcance 15 cm de altura, realizar la aplicación. No existen restricciones en cuanto al estado vegetativo del cultivo.
Soja		100 - 150 g/ha (*) 30 - 50 g/ha + 1.3 kg/ha de glifosato 74.7% SG o 2.5 l/ha de glifosato 48% SL.		Pre-siembra Esperar la emergencia del cebollín y realizar la aplicación sobre plantas de aproximadamente 15 cm de altura. Aplicar por lo menos con 10 días de anticipación, respecto a la fecha prevista de siembra, para evitar la aparición de síntomas de fitotoxicidad.
Tomate industria (Región de Cuyo)		140 g/ha	51	30 y 60 Días desde trasplante (*)
Poroto	Pasto cubano (*Tithonia tubaeformis*)	15 g/ha	70	Tamaño de la maleza menor o igual a 10 cm. Entre V4-V8 del cultivo. Se debe aplicar en prefloración del cultivo.
		30 g/ha		Tamaño de la maleza mayor a 10 cm. Entre V4-V8 del cultivo. Se debe aplicar en prefloración del cultivo.

(*) Se recomienda la doble aplicación en lotes con alta presión de la maleza y cuando se produzca una reinfestación del lote. Aplicar con un coadyuvante no iónico.

Información General:

Halosulfuron es un herbicida recomendado para el control post-emergente de cebollín (Cyperus rotundus) en cultivos de maíz, aplicado en post-emergencia del cultivo y de la maleza; y en cultivos de soja, aplicado en post-emergencia de la maleza y en pre-siembra del cultivo (entre 7 y 10 días antes de la siembra) y en cultivos de arroz, aplicando en post-emergencia del cultivo y maleza.
De acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de la maleza emergida. Los efectos son lentos, transcurridos 15 - 20 días desde la aplicación comienza el amarillamiento y marchitamiento de hojas y tallos que culminan con la muerte total del cebollín tratado.

Preparacion:
Aplicar el producto mezclado con agua y un tensioactivo antes de su aplicación

Equipos, volúmenes, y técnicas de aplicación:
Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores terrestres (de arrastre o automotrices) y por avión.
Aplicaciones en cobertura total:
- Con equipos pulverizadores terrestres debe utilizarse la dosis recomendada, diluída en agua limpia, a razón de 70-100 L/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano (Nº 80-03, 80-02, 110-02, 110-03)
- En aplicaciones aéreas se deben aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 litros por ha (dosis de SEMPRA más agua, mas tensioactivo), observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura de vuelo, tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. No deben realizarse pulverizaciones con avión cuando existan condiciones de inversión térmica ni cuando se presenten vientos fuertes o cualquier otra condición que favorezca la deriva.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: Exento.
Tiempo de reingreso área: No corresponde.
Se puede sembrar cualquier cultivo, en rotación con el cultivo tratado con SEMPRA.
En el caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: es compatible con herbicidas y/o sistémicos. Antes de realizar una mezcla consulte con un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: si por alguna razón debe re-sembrarse un lote tratado con SEMPRA, debe elegirse maíz, soja o sorgo ya que otros cultivos pueden manifestar síntomas de fitotoxicidad si son sembrados dentro de los dos meses de aplicado el producto.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto Formulado:
DL 50 oral: > 8.865,3 mg/kg (rata).
DL 50 oral dermal: > 2.000 mg/kg (rata).
CL 50 inhalatoria: > 6 mg/l. (rata macho).

Irritación cutánea y ocular conejos: no irritante dermal y leve irritante ocular en ojos sin enjuagar, con recuperación completa a las 72 horas.
Sensibilización cutánea: no sensibilizante.

Vía intradermal: leve irritación
Vía tópica: no irritante a 70%.
Toxicidad subcrónica oral acumulativa (estudio de 28 días): nivel sin efecto 1000 ppm.

Riesgos ambientales:
Es prácticamente no tóxico para aves.
Es prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua.
Es virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SEMPRA	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	35981	WG	75%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.