HIDRAZIDA MALEICA

Marcas comerciales: ROYAL MH.

Nomenclatura Química:
hidrazida maleica: sal potásica de 6-hidroxi-3(2H)piridazinona
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: diazina.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo	PC 24,6%: 16 - 18 l/ha	Aplicar 15-20 días antes de la cosecha.
Cebolla	PC 24,6%: 10 - 15 l/ha	Aplicar 15 días antes de la cosecha con un 10-20% de vuelco del cultivo.
Papa	PC 24,6%: 13 - 15 l/ha	Aplicar 4 a 6 semanas antes de la entrega del cultivo.
Tabaco (Tabacos curados a humo; Burley; Maryland; para cigarros Pennsylvania y Wisconsin)	PC 24,6%: 700 - 900 cm3 cada 1000 plantas. (*); 14 - 19 l/ha (**)	Tabacos curados a humo, Burley, negros y tabacos Maryland: 1) Si todas las plantas florecen aprox. al mismo tiempo (el 90% de la planta ha comenzado a mudar las primeras flores) capar y arrancar los brotes de las plantas de maduración precoz, pulverizar uniformemente en todo el cultivo dentro de las 24 hs de haber capado. 2) Si el período de floración es amplio se debe recorrer el cultivo y esperar a que las plantas más tardías estén en plena floración, capar y eliminar los brotes de todo el cultivo y aplicar dentro de las 24 hs de haber capado. Las hojas de las puntas, para ser recolectadas, deberán tener al menos 15 cm de largo al momento de pulverizar. Tabaco cigarro Pennsylvania: 1) En cultivos de floración uniforme se debe: a) Capar cuando el 25-50% de las plantas tienen una o más flores abiertas, b) Esperar 3 días. c) Pulverizar. Para obtener mejores resultados no pulverizar sobre hojas cubiertas de rocío o húmedas. 2) En cultivos de floración irregular se debe: a) Capar cuando el 50-60% de las plantas tienen una o más flores abiertas por cabeza. b) Esperar 3 días y cortar a mano los brotes de más de 5 cm de largo. c) Pulverizar en todo el cultivo. Tabaco cigarro Wisconsin: 1) Capar cuando la mayoría de las plantas del cultivo estén en plena floración. 2) Pulverizar dentro de las 24 hs de haber capado y eliminado los brotes.
Tabaco (Tabacos oscuros)	PC 24,6%: 1400 cm3 cada 1000 plantas. (*); 28 l/ha (**)	

(*) Dosis menores para tabacos curados a humo: Burley y Maryland y tabaco para cigarros Pennsylvania y Wisconsin. Dosis mayores para tabacos oscuros.
(**) Para 20000 plantas/ha

Información General:

Es un regulador de crecimiento de acción sistémica que actúa inhibiendo el crecimiento de brotes en plantas de tabaco, papa, cebolla y ajo.
Contiene en su formulación hidrazida maleica perteneciente al grupo químico de las diazinas, inhibidores de la división celular.
Es absorbido y translocado hacia los puntos de crecimiento activo del vegetal donde ejerce su acción inhibitoria sin afectar el normal desarrollo de las plantas.
Los mejores resultados se obtienen pulverizando de un tercio a la mitad de la planta. Para prevenir el rebrote de tabaco curado a humo, Burley, negros, Maryland, Pennsylvania y Wisconsin.
Tan pronto como las plantas estén en plena floración tapar y arrancar los brotes de las plantas de maduración precoz, pulverizar uniformemente en todo en cultivo dentro de las 24 horas de haber capado.
Existen experiencias en el país para inhibir la brotación en ajo y cebolla.

Aplicando 1 o 2 semanas antes de la cosecha, cuando haya terminado la formación de la cabeza y la parte aérea comienza a volcarse o doblarse hacia abajo.

Evita pérdida de peso e inhibe la brotación una vez cosechadas y almacenadas.
En papa, controla la brotación en el almacenaje y produce una reducción de la producción de papa de pequeño tamaño.

Instrucciones para el uso:
Puede ser aplicado con pulverizadora terrestre o con máquina pulverizadora de aire comprimido. Usar un pico que pulverice en forma de llovizna (no tipo jet). Pulverizadora terrestre: se puede utilizar cualquier número de picos. Puede ser aplicado pulverizando una o más hileras al mismo tiempo, mojando de un tercio a la mitad de la parte superior de cada planta. Pulverizadora de aire comprimido (tipo mochila): utilizar un solo pico que pulverice en un amplio cono. Pulverizar cada hilera caminando a paso constante. Mover el pulverizador hacia arriba y hacia abajo tratando de mojar de 6 a 8 hojas de la parte superior de cada planta. Se recomienda el uso de un coadyuvante para mejorar la eficiencia de aplicación. No es corrosivo a los equipos de pulverización. Después de la aplicación todo el equipo debe lavarse con agua.

Restricciones de uso:
Una aplicación muy temprana puede impedir el normal desarrollo de las hojas superiores.
Tratamientos demasiados tardíos permitirán el crecimiento de algún rebrote. Las lluvias caídas dentro de las seis horas de aplicación pueden reducir la efectividad. Seguir las instrucciones de dosificación cuidadosamente, pulverizar uniformemente.
No usar en plantas destinadas a la producción de semillas.
No pulverizar las plantas en horas del mediodía, en días calurosos y secos, cuando las hojas estén severamente marchitas. Para obtener mejores resultados, pulverizar durante la mañana o durante todo el día, en días nublados evitar aplicar a última hora de la tarde o por la noche. Las plantas a las que se les ha extraído a mano todos los rebrotes o han sido tratadas con Royal® MH madurarán más tardíamente que aquellas a las que no se les han quitado todos los brotes. También bajo algunas condiciones las extremidades tratadas con Royal® MH tienden a volverse amarillas prematuramente. Esto no es perjudicial y

no significa que el tabaco esté maduro. No tomar como única guía para la cosecha del tabaco tratado con Royal® MH el tiempo o el color de las hojas. Considerar otras características tales como:
a) Decoloración a partir de la nervadura central, b) Cambio aparente de la textura de la hoja. En plantas de tabaco que se desarrollan bajo condiciones adversas a la absorción del Royal® MH los resultados no serán tan buenos como en plantas tratadas en condiciones normales.
Dosis demasiado bajas producirán un control menor al deseado. No debe permitirse que la corriente de aire lo lleve a los cultivos vecinos.
Especial cuidado deberá tomarse en aplicaciones aéreas.
Nota: No utilizar en plantas destinadas a la producción de semilla

Dosis demasiado bajas producirán un control menor al deseado. No debe permitirse que la corriente de aire lo lleve a los cultivos vecinos. Especial cuidado deberá tomarse en aplicaciones aéreas.

Tiempo de reingreso al área tratada: Se recomienda ingresar al área tratada 24 hs horas después de realizada la aplicación

Compatibilidad: Antes de realizar mezclas con otros agroquímicos de uso corriente se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala según recomendación de un Ingeniero Agrónomo. No aplicar con productos de reacción alcalina.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del formulado (24,6%):
DL 50 oral aguda para rata: > 5.000 mg/kg
DL50 dermal aguda para rata: > 5.000 mg/kg
CL50 Inhalatoria: > 2,4 mg/l Categoria III Cuidado

No irritante dermal.
Moderado irritante ocular. Cuidado. Categoria III. Causa irritación moderada a los ojos.
No sensibilizante dermal.

Tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ROYAL MH	UPL ARGENTINA S.A.	31269	SL	24,6% (*)	IV

(*) equivalente en hidrazida maleica 18,4 g

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.