IMAZAMOX

Marcas comerciales: SWEEPER 70DG - TRIGOSOL.

Nomenclatura Química:
imazamox: 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-(metoximetil) ácido nicotínico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (post-emergente, TrigoSol).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo Clearfield	Avena guacha, Avena negra (*Avena fatua)* Cebadilla (*Bromus unioloides)* Raigrás (*Lolium multiflorum)*	Lotes con bajo nivel de infestación de malezas (menos de 10 plantas/m2) 70 gramos de Trigosol por hectárea + 100 cm3 de Dicamba 48% por hectárea.	(*)	Hasta 3a hoja.
	Capiquí (*Stellaria media)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare)*	Lotes con mediano a alto nivel de infestación de malezas (más de 10 plantas/m2) 100 gramos de Trigosol por hectárea + 100 cm3 de Dicamba 48% por hectárea		Hasta 4a hoja verdadera.

(*) Uso posicionado.

Información General:

Es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente, con efecto prolongado, para el control de malezas en variedades de trigo con resistencia a imidazolinonas (identificadas en la etiqueta de la bolsa de semilla con el logo CLEARFIELD). Este herbicida es absorbido por el follaje y las raíces y transportado dentro de la planta a los meristemas de crecimiento donde ejerce su acción herbicida. El producto es absorbido por las raíces en menor medida que por las hojas. Luego de la aplicación las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejan de competir con el cultivo y mueren dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a la aplicación. Para el control de las malezas susceptibles que germinen después de la aplicación es necesaria una lluvia que incorpore el producto en el suelo. Ocasionalmente, el cultivo de Trigo CLEARFIELD tratado con este producto puede mostrar un ligero amarillamiento de las hojas y/o un leve acortamiento de los entrenudos; estos síntomas desaparecen en poco tiempo, no afectando los rendimientos. Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y otros productos con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a, otros productos registrados con modos de acción diferentes. Este producto debe ser aplicado en mezcla de tanque con 100 cc/ha de Dicamba 48%. Sugerimos contactar al representante de la empresa proveedora del producto para información adicional.

ADVERTENCIA: las variedades de Trigo con resistencia a Imidazolinonas deberán estar claramente identificadas por los semilleros que las producen con la denominación CLEARFIELD. Este producto aplicado sobre variedades de trigo sin resistencia a Imidazolinonas puede causar graves daños al cultivo.

Uso: herbicida (postemergente, Sweeper 70 DG).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Afata (*Sida rhombifolia)* Amor seco (*Bidens pilosa)* Bejuco (*Ipomoea nil)* Bejuco (*Ipomoea purpurea)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	70 g/ha		Hasta 2a. hoja verdadera.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)*			Hasta 3a. hoja. Aplicaciones posteriores, hasta 6a hoja, control parcial.
	Cebada cervecera (*Hordeum distichum)* Pasto de cuaresma			Hasta 3a. hoja.

	(*Digitaria sanguinalis)* Trigo guacho (*Triticum spp.)*			
	Chamico (*Datura ferox)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*			Hasta 8a. hoja verdadera.
	Chinchilla (*Tagetes minuta)* Farolito San Vicente (*Nicandra peruviana)*			Hasta 4a hoja verdadera.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*			Aplicar hasta los 45 cm de altura. Control parcial.
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			Aplicar entre 2 - 5 hojas.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Hasta 10a. hoja verdadera.

Información General:

Es un herbicida sistémico selectivo post emergente para soja, con acción residual. Este herbicida es absorbido rápidamente por el follaje para su posterior transporte a través de la planta. Es absorbido por las raíces en menor medida que por las hojas. Luego de la aplicación, las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejan de competir con el cultivo, y mueren al cabo de 4 a 6 semanas. Para obtener un óptimo control de malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de aquellas. Además de controlar las malezas en post emergencia, provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de la aplicación (para ello es necesaria una lluvia que incorpore el producto al suelo).
Ocasionalmente, la soja tratada en forma terrestre o aérea puede mostrar un ligero acortamiento de los entrenudos y amarillamiento de las hojas, estos síntomas desaparecen en poco tiempo, no afectando los rendimientos.

Preparación de la solución: llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de herbicida al tanque del pulverizador. Luego completar el tanque con agua. Añadir un tensioactivo no iónico a la concentración de 0,25% de principio activo en el volumen total (250 gramos de principio activo cada 100 litros de agua).
Cuando se deseen realizar mezclas de tanque con otros herbicidas, se recomienda adicionar el otro herbicida primero en el tanque de la pulverizadora y asegurarse que éste esté completamente mezclado antes de agregar el producto. Por último, agregar la cantidad arriba indicada de tensioactivo no iónico. Es importante respetar el orden de mezclado mencionado, es decir, 1°) el otro herbicida, 2°) Imazamox y 3°) el tensioactivo no iónico.

Para evitar posibles daños a cultivos sensibles, se recomienda limpiar cuidadosamente el equipo de aplicación luego de su utilización.

Equipos y formas de aplicación:
a) Aplicaciones terrestres: debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botalón con picos provistos de pastillas de abanico plano. La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30 - 45 libras/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 200 l/ha de agua, procurando un promedio de gotas de caldo por cm2 no menor a 30. Respetar el número de impactos por centímetro cuadrado. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evitar la deriva. Evitar la superposición durante la aplicación.

b) Aplicaciones aéreas: debe cuidarse de no superar los 14 metros de ancho de faja. Se recomienda un volumen de aspersión no menor a 15 l/ha para la Pampa Húmeda y de 20 l/ha para el Noroeste Argentino (Tucumán, Salta y Jujuy). El viento no deberá exceder los 10 km/hora, y tampoco debe aplicarse en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima insolación (de menor humedad relativa).
El promedio de gotas de caldo por cm2 no deberá ser menor a 25, procurando lograr una distribución homogénea del pulverizado. Evite que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes.

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación: hasta disponer de mayor información, sólo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos, siguiendo al cultivo de soja tratado con el producto:
A) Sin restricciones: soja, arveja, lenteja, poroto, maní, alfalfa, tréboles, trébol de olor blanco, trébol de olor amarillo, girasol Clearfield®, maíz Clearfield®, colza Clearfield®
B) Tres meses luego de la aplicación del producto: trigo, cebada, centeno.
C) Cinco meses luego de la aplicación del producto: girasol, maíz, avena, arroz, colza, algodón, tabaco, sorgo granífero y forrajero.

Derrames:
Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado en una planta especializada para tal fin. No utilizar containers de aluminio ni de acero sin costuras. Posteriormente vierta agua sobre el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Adsorber el líquido de enjuague con material adsorbente como arcilla, aserrín o material específico para derrames y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto del producto derramado.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 5,8 mg/l 4 h

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Primeros auxilios
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada, lavar con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: enjuáguelos bien con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de ingestión: provocar el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avisar al médico inmediatamente.
En caso de inhalación: retirar al aire fresco. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Si es necesario efectuar respiración artificial.

Antídoto: no tiene. En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Evitar aplicaciones en el horario de pecoreo de las abejas. Proteger los colmenares cerrando piqueras o trasladándolas a lugares seguros. No contaminar cursos ni fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SWEEPER 70DG	BASF ARGENTINA	32974	WG	70%	IV
TRIGOSOL	BASF ARGENTINA	35973	WG	70%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.