IMAZAPIR + IMAZETAPIR

Marcas comerciales: INTERFIELD - LIGHTNING.

Nomenclatura Química:
imazetapir: ácido 2 -(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolín-2-il-nicotínico
imazapir: ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin 2 - il) nicotínico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona + imidazolinona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol Clearfield	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Chamico (*Datura ferox)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	143 g/ha	Uso posicionado	Hasta 4a hoja verdadera.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			Hasta 3a hoja.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)*			Entre 3a y 7a hoja.
	Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			Hasta 2a hoja verdadera.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*			Estolones de 10 cm.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*			Hasta los 35 cm de altura.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Hasta 10a. hoja verdadera.
Maíz Clearfield	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Chamico (*Datura ferox)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	114 g/ha (*)		Hasta 4a hoja verdadera.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			Hasta 3a hoja.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)*			Entre 3a y 7a hoja.
	Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			Hasta 2a hoja verdadera.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*			Estolones de 10 cm.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*			Hasta los 35 cm de altura.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Hasta 10a. hoja verdadera.
Soja	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)*	143 g/ha (**)		Hasta 4a hoja verdadera.

	Chamico (*Datura ferox)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			Hasta 3a hoja.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)*			Entre 3a y 7a hoja.
	Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			Hasta 2a hoja verdadera.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*			Estolones de 10 cm.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*			Hasta los 35 cm de altura.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Hasta 10a. hoja verdadera.
	Capín colorado (*Echinochloa colona)* Cloris (*Chloris virgata)* Pata de ganso (*Eleusine indica) (***)* Pasto moro (*Leptochloa filiformis)*	200 gr/ha (**) + (1% MSO)		Hasta 3a hoja.

(*) Se obtienen controles parciales de cebollín, gramón y sorgo de Alepo de rizoma.
(**) en pre-siembra de SOJA o barbecho químico
(***) Nota: a la dosis de 200 g de Imazapir + Imazetapir* por hectárea el control es parcial..

Información General:

Es un herbicida post-emergente selectivo con acción residual, para aplicaciones post emergentes tempranas en los cultivos de maíz y girasol con resistencia a imidazolinonas, para aplicaciones pre-siembra en el cultivo de soja en sistemas de intersiembra maíz/soja ó girasol/soja.

Luego de la aplicación post emergente temprana del producto las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejando de competir con el cultivo; la muerte de las mismas puede demorar 3 a 4 semanas. Además de controlar las malezas en post emergencia, provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de la aplicación (para este control es necesaria una lluvia que incorpore el producto al suelo). Para optimizar el control de malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas.

Ocasionalmente, el maíz o girasol con resistencia a imidazolinonas, luego de aplicaciones del producto hasta el estado de sexta hoja expandida, puede presentar una leve clorosis que desaparece con el tiempo, no afectando el rendimiento.

Advertencia: las variedades de maíz y girasol con resistencia a imidazolinonas deberán estar claramente identificadas por los semilleros que las producen con la denominación "Clearfield". El producto aplicado sobre variedades de maíz ó girasol sin resistencia a imidazolinonas puede causar graves daños al cultivo.

Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, estos productos y otros productos con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a, otros productos registrados con modos de acción diferentes.

Derrames:

Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 2000 mg/kg.

No es irritante dermal y es moderadamente irritante ocular.

Primeros auxilios:
En caso de contacto con los ojos: enjuáguelos bien con abundante agua durante 15 minutos. Consulte al médico inmediatamente si la irritación persiste.
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. Consulte al médico inmediatamente si la irritación persiste.
En caso de ingestión: provocar el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avisar al médico inmediatamente.

No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso laboral de este producto.

No posee advertencias toxicológicas especiales.

Advertencia al médico interviniente: en caso de accidentes, aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos.

Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para organismos acuáticos y ligeramente tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. No contaminar cursos ni fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
INTERFIELD	BASF ARGENTINA	34938	WG	52,5% + 17,5%	IV
LIGHTNING	BASF ARGENTINA	33104	WG	52,5% + 17,5%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.