IMAZAQUIN

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS TOPGAN.

Nomenclatura Química:
imazaquin: sal amónica del ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-Imidazolin 2-il)-3-quinolincarboxílico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (preemergente/postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Abrojillo (*Xanthium strumarium)* Abrojo (1) (*Xanthium cavanillesii)* Afata (*Sida rhombifolia)* Afata hembra (*Sida spinosa)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Farolito (1) (*Nicandra peruviana)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Sunchillo (*Wedelia glauca)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo cubano (*Tithonia tubaeformis)* Ataco	PC 16,1%: 1,3 l/ha (*) PC 21,1%: 1 l/ha (*) PC 70%: 290 g/ha (*) En mezcla con dinitroanilinas, dosis según tipo de suelo: Liviano: PC 16,1%: 1 - 1,3 l/ha o PC 21,1%: 0,75 - 1 l/ha + Pendimetalin 33%: 2,5 l/ha +Trifluralina 48%: 1,5 l/ha Mediano: PC 16,1%: 1 - 1,3 l/ha o PC 21,1%: 0,75 - 1 l/ha + Pendimetalin 33%: 3 l/ha + Trifluralina 48%: 1,8 l/ha Pesado: PC 16,1%: 1 - 1,3 l/ha o PC 21,1%: 0,75 - 1 l/ha + Pendimetalin 33%: 3,8 l/ha + Trifluralina 48%: 2 l/ha	60	Presiembra: aplicar sobre suelo preparado, libre de terrones y grandes desniveles, hasta 30 días antes de la siembra (presiembra anticipada). No es necesaria la incorporación inmediata de imazaquin. Antes de la siembra, realice una labor superficial para destruir la vegetación existente, romper el encostramiento e incorporar el producto con alguno de los siguientes implementos: rastra rotativa, rastra de discos, vibrocultivador, "tandem" disco-rastra de dientes-rolo. Estos implementos deben trabajar incorporando a una profundidad no mayor a los 5 cm. Si la aplicación se realiza inmediatamente antes de la siembra, debe incorporarse en la forma descripta anteriormente (presiembra incorporada) mezclando el producto superficialmente para evitar el desplazamiento del mismo por la sembradora. Preemergencia/emergencia: aplicar después de la siembra, desde el estado de preemergencia del cultivo y la maleza hasta la aparición de la primera hoja verdadera de las malezas emergidas. Las aplicaciones después de este estado resultarán en una actividad herbicida menor sobre algunas especies de malezas. Puede aplicarse durante la emergencia del cultivo y la maleza. Es necesario que se produzca una lluvia suficiente para humedecer los primeros 5 cm. del perfil del suelo antes de transcurridos 7 a 10 días desde la aplicación. Si se prolonga el período de sequía pueden producirse escapes de algunas malezas. Si luego de un período de sequía, se producen lluvias adecuadas, el imazaquin proveerá control residual de malezas en germinación; el control de las malezas establecidas dependerá de la especie y el tamaño adquirido por ellas. Cuando el producto se haya mezclado superficialmente, puede transcurrir un período más prolongado hasta la ocurrencia de la primera lluvia. Una labor de cultivo superficial (rastra rotativa, escardillo plano) puede contribuir al control de malezas que emergen durante períodos de sequía. (*) Se alcanzan controles parciales de las siguientes malezas: sorgo de Alepo de rizoma, cebollín, pie de gallina, cadillo y sunchillo.

	(*Amaranthus lividus)* Ataco espinudo (*Amaranthus spinosus)*	PC 16,1%: 0,4 - 0,66 l/ha PC 21,1%: 300 - 500 cm3/ha PC 70%: 90 - 150 g/ha		Recomendación para Adama Essentials Topgun: Post-emergencia: utilizar la dosis menor cuando la maleza no supere los 15 cm de altura. La dosis mayor debe utilizarse hasta que la maleza tenga 40 cm. de altura y no haya iniciado la floración. Recomendación para Scepter 21,1%SL: únicamente en el área Noroeste: 0,5 l/ha; en mezcla de tanque, 0,4 l/ha más Pendimetalin 33%: 3 l/ha o Trifluralina al 48%: 2,5 l/ha. Cuando se mezcle con Pendimetalin 33% o Trifluralina al 48%: debe aplicarse antes o inmediatamente después de la siembra (antes de transcurridas 24 horas.) y siempre antes de la emergencia del cultivo y las malezas. En post-emergencia: de 0,3 a 0,5 l/ha. La dosis menor sólo puede emplearse si la maleza no supera los 15 cm de altura.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	PC 16,1%: 0,5 l/ha PC 21,1%: 0,5 l/ha PC 70%: 120 g/ha		Recomendación para Adama Essentials Topgun: Únicamente en el área Noroeste en mezcla de tanque con 3 l/ha de pendimentalin 33% o 2,5 l/ha de alaclor 48%. Aplicar antes o 24 horas inmediatamente después de la siembra, siempre antes de la emergencia del cultivo y las malezas. Recomendación para Scepter 21,1%SL: post-emergencia: 0,3 a 0,5 litro por ha. La dosis menor sólo puede emplearse si la maleza no supera los 15 cm de altura.

Control de malezas de imazaquin con dinitroanilinas: con las mezclas de tanque de imazaquin con pendimetalin y trifluralina, además de las malezas indicadas en el cuadro de recomendaciones de uso se puede controlar pie de gallina (Eleusine indica) y altas infestaciones de pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis).

(1) Recomendación para Scepter/Scepter 70DG

Información General:

Herbicida selectivo para soja, que puede aplicarse en pre-siembra, en pre-emergencia, en el momento de la emergencia del cultivo y las malezas (malezas al estado de cotiledón) y en post-emergencia, para el control de Yuyo colorado.
En aplicaciones al suelo, para obtener un óptimo control, las malezas absorberán el producto luego de su germinación, si el suelo se halla húmedo. Por lo tanto, luego de la aplicación deben existir condiciones adecuadas de humedad en el suelo durante un período mínimo de 2 - 3 semanas.
Si las malezas han emergido, agregar un tensioactivo no iónico a la concentración de 0,25% de ingrediente activo en volumen total (250 gramos de ingrediente activo cada 100 l de agua).
Ocasionalmente, bajo condiciones de tiempo muy húmedo y frío, puede producirse un acortamiento de los entrenudos del cultivo. Con el desarrollo del cultivo, estos síntomas desaparecen rápidamente y no afectan el rendimiento.
La presión de aspersión debe ser de 25 - 40 lb/pulg2 y el volumen de 150 a 200 l/ha.

Control de malezas de imazaquin con dinitroanilinas: con las mezclas de tanque de imazaquín con pendimentalín y trifluralina, además de las malezas indicadas en el cuadro de recomendaciones de uso se puede controlar pie de gallina (Eleusine indica) y altas infestaciones de pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis).

En suelos livianos es recomendable sembrar 10 a 15 días después de la aplicación para evitar retrasos en la emergencia del cultivo.
Cuando la mezcla de tanque se realice con pendimentalín 33%, se deberá incorporar en forma superficial (5 cm.) con una rastra de dientes inclinados hacia atrás y a una velocidad mínima de 8 a 10 km/hora, pudiendo realizarse esta labor desde la aplicación hasta el momento inmediato antes de la siembra.
Si la mezcla se realiza con trifluralina 48% EC la incorporación deberá efectuarse dentro de las 4 horas posteriores a la aplicación para evitar la fotodegradación de la dinitroanilina.
La dosis menor de imazaquin no ejerce control de cebollín, sorgo de Alepo de rizoma, y sunchillo y sólo hay una reducción de la incidencia de chamico, chinchilla, farolito y malva cimarrona.

Equipos de aplicación: puede aplicarse con pulverizadoras terrestres equipadas para trabajar a una presión de 1,75 a 2,8 kg/cm (25 - 40 lb/pulg2), provistas de una barra o botalón con picos de abanico plano, diseñados para aplicar herbicidas. Llene el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en movimiento vierta la cantidad recomendada de herbicida en la pulverizadora. Luego complete el tanque con agua.

Forma de aplicación: debe aplicarse uniformemente en 150 a 200 litros de agua/ha, sobre suelo preparado, libre de grandes terrones. Si las malezas han emergido agregar un tensioactivo no iónico. En aplicaciones post-emergentes (para el control de yuyo colorado) se recomienda un volumen de 200 litros de agua/ha.

Advertencia: EVITAR que la deriva de aspersión caiga sobre otros cultivos adyacentes. EVITAR la superposición durante la aplicación.
Aplicaciones aéreas: añadir un tensioactivo no iónico a la concentración de 0,25% de principio activo en el volumen total (250 gramos de P.A. cada 100 litros de agua).
Debe cuidarse de no superar los 14 m de ancho de faja. Se recomienda un volumen de aspersión no menor a 15 litros de agua/ha para la pampa húmeda y de 20 l/ha para el NOA (Tucumán, Salta y Jujuy). El viento no debe exceder los 10 km por hora y tampoco debe aplicarse en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima insolación (de menor humedad relativa). El promedio de gotas de caldo por cm2 no deberá ser menor a 25, procurando lograr una distribución homogénea del pulverizado. Evite que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes.

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación:

- Pueden sembrarse como cultivos de rotación, sucediendo a la soja tratada con el producto sin restricciones: soja, poroto, arveja, maní.

- Debe transcurrir un período de 5 meses desde la aplicación del producto hasta la siembra de los siguientes cultivos: alfalfa, avena, cebada, cebadilla criolla, centeno, festuca, pasto ovillo, raigrás, trébol blanco, tréboles de olor (blanco y amarillo) y trigo.
Sorgo granífero: debe transcurrir un período mínimo de aplicación-siembra de 11 meses.
Maíz: deben cumplirse las siguientes condiciones:
. Lluvias: la lluvia total caída desde la aplicación hasta los 120 días posteriores debe ser de 300 mm o más. La lluvia total caída desde la aplicación hasta la siembra del maíz debe ser de 600 mm o más.
. Preparación del suelo: deberá realizarse una labor profunda con arado de reja.
. Siembra: el maíz debe sembrarse después del 1° de octubre y el período mínimo aplicación-siembra debe ser de 10 meses.
. Manejo del cultivo: las prácticas del manejo del maíz, tales como preparación del suelo, siembra adecuada, control de plagas y malezas deben asegurar un buen crecimiento.

Nota: en áreas donde la dosis exceda la recomendada debido a superposición en la aplicación (cabeceras), menor velocidad o detención de la pulverizadora, el maíz puede presentar síntomas tales como menor desarrollo, amarillamiento, clorosis internerval.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. En el caso de productos sólidos sin diluir, barrer y juntar el producto. En ambos casos (barrido y el material absorbido) deberán colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Ingrediente activo:
DL 50 oral aguda para ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda para conejos: > 2000 mg/kg.

Del producto formulado 16,1%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejos):	DL50: > 4000 mg/kg

Del producto formulado 70%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Irritación dermal:	Liegeramente irritante
Irritación ocular (conejo):	Moderado irritante
Sensibilización dermal (cobayo):	No sensibilizante

Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:	Producto al 16,1%
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Riesgos ambientales:	Producto al 70%
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces.
No contaminar cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS TOPGAN	ADAMA ARGENTINA SA	35941	SL	16,1%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.